# Nuprid® Supreme SC

| Indicazioni di pericolo CLP | | Confezioni |
|---|---|---|
|  ATTENZIONE<br>**Frasi H**<br>H410, EUH208, EUH401 | | 1 L  |
| **Gruppo IRAC**<br>4A | **Marchio registrato**<br>Nufarm Italia Srl | **Titolare registrazione**<br>Nufarm Italia Srl |
| **Gruppo imballaggio**<br>III | **Trasporto ONU**<br>3082 | **Classificazione ADR**<br>9 |

**Insetticida - aficida sistemico**

**Caratteristiche:** Nuprid Supreme SC è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.

**Composizione:** **Imidacloprid** puro 17,8 g (200 g/l)

**Registrazione:** N° 14828 del 25-01-2011

**Formulazione:** SC - Sospensione concentrata

| Colture (intervallo sicurezza) | Avversità controllate | Dosi | Modalità d'impiego |
|---|---|---|---|
| Pomacee (melo, pero) (28 giorni melo; 50 giorni pero) | Afidi *(Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi)*, Eriosoma *(Eriosoma lanigerum)*, Cicaline *(Empoasca flavescens)*, Microlepidotteri *(Leucoptera scitella, Phyllonorycter (Lithocolletis) Lyonetia clerkella)*, Psilla del melo (*Psilla mali, Cacopsylla* sp.), Tentredine *(Hoplocampa testudinea)* (pero) | 0,5-0,75 l/ha | Trattamenti consentiti solo in fase di post-fioritura. Su impianti in produzione distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto. Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento. |
| Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco, mandorlo) (21 giorni per pesco, nettarine, susino, ciliegio; 35 giorni albicocco; 14 giorni mandorlo) | Afidi *(Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus amygdali, Hyalopterus* sp.*)* | 0,05% (50 ml/hl d'acqua) | Trattamenti consentiti solo in fase di post-fioritura, dallo stadio di completa caduta petali in poi. Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter* sp.). Su impianti in produzione distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto. |
| | Tentredine *(Hoplocampa brevis, Hoplocampa flava)* (susino), Cimicetta del mandorlo *(Monosteira unicostata)*, *Metcalfa pruinosa*, Cicaline | 0,05% (50 ml/hl d'acqua) | |
| Agrumi (arancio, clementino, mandarino) (14 giorni) | Afidi *(Aphis gossypii, Aphys citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii)*, | 0,05% (50 ml/hl d'acqua) | Trattamenti consentiti solo in fase di post-fioritura. Su Impianti in produzione distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto. |
| | Aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri,* ecc.), Minatrice serpentina delle foglie *(Phyllocnistis citrella)* | 0,075% (75 ml/100 l d'acqua) | Trattamenti consentiti solo in fase di post-fioritura. Su Impianti in produzione distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto. |
| Vite (in vivaio) (14 giorni) | Cicaline *(Scaphoideus titanus, Empoasca vitis (= flavescens))*, Metcalfa *(Metcalfa pruinosa)*, Fillossera *(Viteus vitifoliae)* | 0,05% (50 ml/hl d'acqua) | Trattamenti consentiti solo in fase di post-fioritura. Distribuire 0,5 l/ha di prodotto. |
| Olivo (da olio) (28 giorni) | Mosca *(Dacus = Bactrocera oleae)* | 0,052%-0,062% (= 52-62 ml/hl di acqua) | Trattamenti consentiti solo in fase di post-fioritura. Su impianti in produzione distribuire 0,6-0,8 l/ha di prodotto. |
| Pomodoro, Melanzana (in serra ed in pieno campo) (7 giorni) | Afidi *(Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani)* | 0,05% (50 ml/hl) | Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto. |
| | Aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*), Dorifora *(Leptinotarsa decemlineata)* | 0,075% (75 ml/hl d'acqua) | Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto. |
| Zucchino, Cetriolo, Peperone, Cocomero, Melone (in serra) (3 giorni cetriolo, zucchino; 7 giorni cocomero, melone, peperone) | Afidi *(Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani)* | 0,05% (50 ml/hl d'acqua) | Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto. |
| | Aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) | 0,075% (75 ml/hl d'acqua) | Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto. |
| Lattughe e simili (crescione o becca lunga, dolcetta, lattuga, scarola/invidia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella) (3 giorni) | Afidi *(Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae)* | 0,05% (50 ml/l d'acqua) | Distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto. |

Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).



Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni

# Nuprid Supreme SC

| Colture (intervallo sicurezza) | Avversità controllate | Dosi | Modalità d'impiego |
|---|---|---|---|
| Fagiolo, Fagiolino (in pieno campo ed in serra) (3 giorni) | Afidi *(Aphis acanthi, Aphis craccivora, Aphis fabae)* | 0,05% (50 ml/hl d'acqua) | Distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto. In pieno campo irrorare solo in post-fioritura ed esclusivamente le varietà determinate e con unica fioritura ben definita. |
| Cavolfiore, Broccolo (14 giorni) | Afidi *(Brevicoryne brassicae, Myzus persicae)* | 0,05% (50ml/hl d'acqua) | Distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto. |
| Patata (14 giorni) | Afidi *(Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum eupharbiae)* | 0,05% (50 ml/hl d'acqua) | Distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto. |
| | Dorifora *(Leptinotarsa decemlineata)* | 0,075% (75 ml/hl d'acqua) | Distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto. |
| Carciofo (3 giorni) | Afidi *(Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae)* | 0,05% (50 ml/hl d'acqua) | Distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto. |
| Fragola (in serra) (30 giorni) | Afidi *(Chaetosiphon fragaefolii)*, Aleurodidi *(Trialeurodes vaporariorum)* | 0,75 l/ha | Trattamento per irrigazione. |
| Tabacco (14 giorni) | Afidi *(Myzus nicotianae, Myzus persicae)*, Altica *(Epithrix hirtipennis)* | 0,05% (50 ml/hl d'acqua) | Su piante ben sviluppate distribuire 0,5 l/ha di prodotto. Su tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto. |
| Floreali ed ornamentali (in serra e in pieno campo) | Afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rasae*), Metcalfa pruinosa | 0,05% (50 ml/hl d'acqua) | Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro d'acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. Effettuare i trattamenti solo dopo la fioritura su piante ornamentali che fioriscono nell'anno del trattamento. |
| | Aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) | 0,075% (75 ml/hl d'acqua) | Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro d'acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. Effettuare i trattamenti solo dopo la fioritura su piante ornamentali che fioriscono nell'anno del trattamento. |

**Indicazioni per il corretto impiego** - Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali e applicare il prodotto con mezzi meccanici che riducano la deriva minima del 75%.
Effettuare al massimo un trattamento l'anno.

Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni