FALCON MK

Indicazioni di pericolo CLP		Confezioni
 PERICOLO **Frasi H** H304, H319, H411, EUH066, EUH208, EUH401		1 L - 5 L 
Gruppo HRAC A	**Marchio registrato** Adama Italia S.r.l.	**Titolare registrazione** Adama Quena NV
Gruppo imballaggio III	**Trasporto ONU** 3082	**Classificazione ADR** 9

Erbicida di post-emergenza per la lotta alle infestanti graminacee in colture a foglia larga e per la lotta al riso crodo

Caratteristiche: Falcon MK è un erbicida di post-emergenza per la lotta alle infestanti graminacee in colture a foglia larga e al riso crodo.
Falcon MK controlla: *Agropyron repens* (falsa gramigna), *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena* sp. (avena selvatica), *Cynodon dactylon* (gramigna), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (giavone), *Lolium* sp. (loglio), *Panicum dichotomiflorum* (giavone americano), *Panicum miliaceum*, *Phalaris* sp. (falaride), *Setaria* sp. (Setaria), *Sorghum halepense* (sorghetta) da seme e da rizoma, nonchè nascite spontanee di cereali.

Composizione: **Propaquizafop** puro 9,70 g (= 100 g/l)

Miscibilità: Il prodotto è miscibile con i più comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri).

Registrazione: N° 15253 del 16-12-2011

Formulazione: EC - Emulsione concentrata

Colture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Aglio, broccoli, carciofo, carota, cavolo cappuccio, cipolla, fagiolo, favino, melone, pisello, patata, pomodoro, spinacio, tabacco, asparago, vivai di fruttiferi e di specie ornamentali (30 giorni)	*Agropyron repens* (falsa gramigna), *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena* sp. (avena selvatica), *Cynodon dactylon* (gramigna), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (giavone), *Lolium* sp. (loglio), *Panicum dichotomiflorum* (giavone americano), *Panicum miliaceum*, *Phalaris* sp. (falaride), *Setaria* sp. (Setaria), *Sorghum halepense* (sorghetta) da seme e da rizoma, nonchè nascite spontanee di cereali	0,8 - 1,2 l/ha	Il prodotto deve essere applicato in post-emergenza in una quantità d'acqua di 300-500 litri per ettaro quando tutte le infestanti da combattere sono già emerse e non troppo sviluppate. Contro *Agropyron repens*, in caso di emergenza scalare da rizoma o di forte infestazione, potrebbe rendersi necessario un secondo trattamento a dose ridotta.
Girasole, colza, soia, cotone, barbabietola da zucchero (60 giorni)	*Agropyron repens* (falsa gramigna), *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena* sp. (avena selvatica), *Cynodon dactylon* (gramigna), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (giavone), *Lolium* sp. (loglio), *Panicum dichotomiflorum* (giavone americano), *Panicum miliaceum*, *Phalaris* sp. (falaride), *Setaria* sp. (Setaria), *Sorghum halepense* (sorghetta) da seme e da rizoma, nonchè nascite spontanee di cereali	0,8 - 1,2 l/ha	Il prodotto deve essere applicato in post-emergenza in una quantità d'acqua di 300-500 litri per ettaro quando tutte le infestanti da combattere sono già emerse e non troppo sviluppate. Contro *Agropyron repens*, in caso di emergenza scalare da rizoma o di forte infestazione, potrebbe rendersi necessario un secondo trattamento a dose ridotta.
Riso	Riso crodo e giavone *(Echinochloa crus-galli)*	1 l/ha di prodotto da solo oppure 0,75-1 l/ha in miscela con Glifosate	Trattamenti in pre-semina dopo l'emergenza delle infestanti con 300-500 litri di acqua ad ettaro. Prima del trattamento attendere che le infestanti siano completamente emerse. Impiegare il prodotto dopo aver tolto l'acqua dalla risaia (terreno umido); dopo l'applicazione aspettare almeno 24-48 ore prima di reimmettere l'acqua nella risaia e farla scorrere per almeno altre 48-72 ore prima della semina.
Lattughe e simili (15 giorni)	*Agropyron repens* (falsa gramigna), *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena* sp. (avena selvatica), *Cynodon dactylon* (gramigna), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (giavone), *Lolium* sp. (loglio), *Panicum dichotomiflorum* (giavone americano), *Panicum miliaceum*, *Phalaris* sp. (falaride), *Setaria* sp. (Setaria), *Sorghum halepense* (sorghetta) da seme e da rizoma, nonchè nascite spontanee di cereali	0,8 - 1,2 l/ha	In post-emergenza in una quantità d'acqua di 300-500 litri per ettaro quando tutte le infestanti da combattere sono già emerse e non troppo sviluppate.

Indicazioni per il corretto impiego - Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate.

Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni