Mezene® WG

Fungicida organico per trattamenti liquidi in frutticoltura

Composizione: **Ziram** puro 76 g

Miscibilità: Miscibile con gli antiparassitari ad azione neutra.

Registrazione: N° 13143 del 09-09-2006

Formulazione: WG - Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)


Indicazioni di pericolo CLP



PERICOLO

Frasi H
H302, H317, H318, H330, H373, H410, EUH401

Confezioni
1 kg - 5 kg - 20 kg



Gruppo FRAC	Marchio registrato	Titolare registrazione
M3	Isagro Spa	Taminco Italia S.r.l.
Gruppo imballaggio	**Trasporto ONU**	**Classificazione ADR**
III	3077	9

Colture (intervallo di sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Melo (fine fioritura)	Ticchiolatura	180-250 g/hl (max 3 kg/ha)	Max 4 trattamenti, dei quali max 2 dopo la fioritura. Intervallo minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.
Pero (60 giorni)	Ticchiolatura, Maculatura bruna	180-250 g/hl (max 3 kg/ha)	Max 4 trattamenti, dei quali max 2 dopo la fioritura. Intervallo minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.
Nespolo (60 giorni)	Ticchiolatura	180-250 g/hl (max 3 kg/ha)	Max 4 trattamenti, dei quali max 2 dopo la fioritura. Intervallo minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.
Pesco (fine fioritura)	Bolla, Corineo	200-450 g/hl (max 3 kg/ha)	Trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura. Max 3 trattamenti. Intervallo minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.
Ciliegio, Susino (fine fioritura)	Corineo	200-450 g/hl (max 3 kg/ha)	Trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura. Max 3 trattamenti. Intervallo minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.
Mandorlo (150 giorni)	Bolla, Corineo	200-450 g/hl (max 3 kg/ha)	Trattamenti autunno-vernini. Max 3 trattamenti. Intervallo minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.

Indicazioni per il corretto impiego - Le varietà di pero Spadona d'estate, Spadoncina, Coscia, Gentil bianca, Gentilona, Cannellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con Mezene WG. Le varietà di pesco del gruppo Red Haven sono sensibili allo ziram. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m.

Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni