ZORO® 1,9 EW

Composizione	**Abamectina 1,89% (18 g/L)**
Formulazione	**Emulsione olio/acqua**
Gruppo	**IRAC 6**
N. registrazione	**15168 del 26-11-2012**
Confezione	**1 L (x 12), 5 L (x 4)**

Insetticida-acaricida in emulsione olio/acqua registrato su un ampio numero di colture

CARATTERISTICHE

ZORO 1,9 EW è un insetticida-acaricida efficace nei confronti di tutte le forme mobili degli insetti e degli acari. L'originale formulazione olio/acqua esalta il potere abbattente dell'abamectina e garantisce la massima selettività per le colture.

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
AGRUMI (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone)	Minatrice serpentina (*Phyllocnistis citrella*)	30-40 ml/hl (dose massima 0,8 l/ha) ad intervalli di 7 gg dalla comparsa delle prime mine sui getti nuovi in formazione. max 3 applicazioni all'anno)	10 gg
	Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae*, *Panonychus citri*), Eriofidi (*Aceria sheldoni*)	30-40 ml/hl (dose massima 0,8 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili. (max 3 applicazioni all'anno)	
PERO	Psylla (*Psylla spp.*) Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae* e *Panonychus ulmi*), Eriofide (*Epitrimerus pyri*, *Eriophyes pyri*)	50-100 ml/hl (0,375–1,20 l/ha) a fine caduta petali o alla comparsa delle prime neanidi/primi fitofagi	3 gg
MELO	Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae* e *Panonychus ulmi*)	80 ml/hl (0,60-0,96 l/ha) a fine caduta petali o allacomparsa dei primi fitofagi	3 gg
PESCO, NETTARINE	Ragnetti rossi e altri acari (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*, *Bryobia rubricolus*)	50-100 ml/hl (0,5-1,2 l/ha) a fine caduta petali o allacomparsa dei primi fitofagi	14 gg Pesco
VITE DA TAVOLA	Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae* e *Panonychus ulmi*), Ragnetto giallo (*Eotetranychus carpini*)	50-100 ml/hl (0,5-1,2 l/ha) alla comparsa delle prime delle prime larve o alla comparsa delle prime forme mobili presenti sul 70% delle foglie	10 gg



Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

ZORO® 1,9 EW

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
VITE DA VINO	Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae* e *Panonychus ulmi*), Ragnetto giallo (*Eotetranychus carpini*)	50-100 ml/hl (0,25-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili presenti sul70% delle foglie	10 gg
POMODORO (serra e pieno campo)	Ragnetti rossi (*Tetranychus spp.*, *Polyphagotarsonemus latus*), Eriofide (*Aculus lycopersici*), Larve di tripide (es. *Frankliniella occidentalis*, etc.), Tignola del pomodoro (*Tuta absoluta*), Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*)	50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) ad intervalli di circa 7 giorni (1-3 applicazioni)	3 gg
MELANZANA (serra e pieno campo)	Ragnetto rosso (*Tetranychus spp.*), Larve di tripide (es. *Frankliniella occidentalis*, etc.)	50-80 ml/hl (0,15-0,8 l/ha) ad intervalli di circa 7 giorni (1-3 applicazioni)	3 gg
PEPERONE	Ragnetto rosso (*Tetranychus spp.*), Eriofide (*Eriophys spp.*), Larve di tripide (es. *Frankliniella occidentalis*, etc.)	50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) ad intervalli di circa 7 giorni (1-3 applicazioni)	3 gg
MELONE, COCOMERO, CETRIOLO (serra e pieno campo)	Ragnetti rossi (*Tetranychus spp.*), Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*), Larve di tripide (es. *Frankliniella occidentalis* etc.)	50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) ad intervalli di circa 7 giorni (1-2 applicazioni)	5 gg in pieno campo 3 gg in serra
FRAGOLA (in serra)	Ragnetti rossi (*Tetranychus spp.*, *Phytonemus pallidus*), Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*), Larve di tripide (es. *Frankliniella occidentalis* etc.)	50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) ad intervalli di circa 7 giorni (1-2 applicazioni)	3 gg
COLTURE ORNAMENTALI E FLORICOLE	Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*), Ragnetto rosso comune (*Tetranychus spp.*), Larve di tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*)	50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) ad intervalli di circa 7 giorni (1-3 applicazioni)	-
LATTUGHE E ALTRE INSALATE in pieno campo	Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*), Ragnetti rossi (*Tetranychus spp.*, *Polyphagotarsonemus latus*), Larve di tripide (es. *Frankliniella occidentalis* etc.)	50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) ad intervalli di circa 7 giorni (1-3 applicazioni)	7 gg

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.