



## ERBICIDA DI PRE-EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI SU PATATA E SOIA

38  
ERBICIDI

**METRIC** è una miscela di microcapsule di Clomazone in una sospensione concentrata di Metribuzin (ZC). La formulazione dei due principi attivi offre un'azione sinergica e complementare su di un ampio novero di infestanti. Il prodotto deve essere applicato subito dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti.

### COMPOSIZIONE

Clomazone puro 60 g/l  
Metribuzin puro 233 g/l

### FORMULAZIONE

Miscela di capsule sospese  
e sospensione concentrata (ZC)

### CLASSIFICAZIONE CLP

Attenzione



### REGISTRAZIONE

n. 14432 del 13/02/2012 (\*)



(\*) Titolare della registrazione  
BELCHIM CROP PROTECTION  
Italia S.p.A.

SCHEDA DI SICUREZZA



ETICHETTA



CONFEZIONE



1 l  
5 l

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	DOSE	TEMPO DI CARENZA
PATATA	<p><b>Monocotiledoni:</b> Coda di volpe (<i>Alopecurus myosuroides</i>), Sanguinella (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Giavone (<i>Echinochloa crus galli</i>), Fienarola (<i>Poa annua</i>)</p> <p><b>Dicotiledoni:</b> Cencio molle (<i>Abutilon theophrasti</i>), Prezzemolo di cane (<i>Aethusa cynapium</i>), Amaranto blitoido (<i>Amaranthus blitoides</i>), Amaranto a spiga verde (<i>Amaranthus cruentus</i>), Atriplice (<i>Atriplex patula</i>), Borsa del pastore (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), Fiordaliso (<i>Centaurea cyanus</i>), Farinaccio comune (<i>Chenopodium album</i>), Chenopodio rosso (<i>Chenopodium rubrum</i>), Stramonio (<i>Datura stramonium</i>), Fumaria (<i>Fumaria officinalis</i>), Galinsoga (<i>Galinsoga parviflora</i>), False ortiche (<i>Lamium spp.</i>), Camomilla comune (<i>Matricaria chamomilla</i>), Mercorella (<i>Mercurialis annua</i>), Correggiola (<i>Polygonum aviculare</i>), Poligono convolvolo (<i>Polygonum convolvulus</i>), Persicaria (<i>Polygonum persicaria</i>), Erba porcellana (<i>Portulaca oleracea</i>), Ravanello selvatico (<i>Raphanus raphanistrum</i>), Senape selvatica (<i>Sinapis arvensis</i>), Erba morella (<i>Solanum nigrum</i>), Centocchio (<i>Stellaria media</i>), Viola dei campi (<i>Viola arvensis</i>)</p>	1,5 l/ha	-
SOIA			

#### AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il numero massimo di trattamenti è di 1 all'anno. Si raccomanda l'uso di ugelli a bassa deriva. Evitare l'uso del prodotto su terreni sabbiosi o molto leggeri. Non usare su terreni che contengono oltre il 5% di sostanza organica. Per la sicurezza della coltura la semina deve essere effettuata con un minimo di 20 mm di profondità nel terreno. Per un controllo ottimale, il letto di semina dovrebbe essere compatto, piano e libero da grandi zolle. Non applicare su terreni sciolti se si prevedono piogge intense entro le 24 ore, pena fenomeni di fitotossicità o di riduzione di efficacia, specialmente su soia.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.