

# CHEMOL PLUS®

OLIO BIANCO PARAFFINICO AD ELEVATO GRADO DI INSOLFONABILITÀ PER GLI IMPIEGHI PRIMAVERILI-ESTIVI SU COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

NEW

## COMPOSIZIONE:

Olio paraffinico [CAS n. 8042-47-5] ..... g 80  
(al 95% di insolfonabilità)

**CARATTERISTICHE:** **CHEMOL PLUS** per le sue particolari caratteristiche chimico-fisiche - residuo insolfonabile 95% e stretto intervallo di distillazione - risulta altamente selettivo verso le colture erbacee ed arboree.

**DOSE DI IMPIEGO:** Il trattamento con **CHEMOL PLUS** può essere ripetuto rispettando un intervallo minimo di 10-12 giorni sulle colture arboree e di 7-8 giorni sulle colture erbacee.

Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

**POMACEE:** Psille: 1.5-2 l/hl

Acari, Afidi, Cocciniglie, Cicaline, Eriofidi, Metcalfa: 0.5-1.2 l/h

**DRUPACEE:** Cocciniglie, Ragnetto rosso dei fruttiferi, Afidi, Cicaline, Eriofidi, Metcalfa: 0.5-1.2 l/hl

**VITE:** Cocciniglie, Acari, Cicaline, Metcalfa: 0.5-1.2 l/hl

**OLIVO:** Cocciniglie: 1-1.5 l/hl

**NOCCIOLO:** Cimice, Eriofidi, Afidi: 0.5-1.2 l/hl

**NOCE, MANDORLO:** Afidi, Cocciniglie: 0.5-1.2 l/hl

**AGRUMI:** Cocciniglie, Minatori fogliari: 1.5-2 l/hl - Afidi, Cimice verde, Acari, Aleurodidi: 0.5-1.2 l/hl

**FICO, CACO:** Psilla, Cicaline, Metcalfa, Cocciniglie: 0.5-1.2 l/hl

**RIBES:** Afidi, Cocciniglie: 0.5-1.2 l/hl

**FAGIOLO:** Afidi, Acari, Tripidi: 0.5-1.2 l/hl - come coadiuvante erbicidi: 0.5-1.0 l/hl

**PEPERONE, POMODORO, PATATA:** Afidi, Acari, Ditteri agromizidi: 0.5-1.2 l/hl

**CUCURBITACEE:** Afide del cotone, Aleurodidi, Tripidi, Acari, Ditteri agromizidi: 0.5-1.2 l/hl

**CARCIOFO, SEDANO, FINOCCHIO:** Afidi, Aleurodidi, Lepidotteri, Ditteri agromizidi, Acari: 0.5-1.2 l/hl

**ORNAMENTALI, FORESTALI, FLOREALI:** Afidi, Aleurodidi, Lepidotteri, Ditteri, Psille, Cocciniglie, Cicaline, Acari, Tingidi, Metcalfa: 0.5-1.2 l/hl

**COMPATIBILITÀ:** **CHEMOL PLUS** non è miscibile con i prodotti a base di zolfo e le seguenti molecole: polisolfuri, captano, folpet, chinometionato, bupirimate, diclofluanide, ometoato, dimetoato, formotion, propargite, tetradifon. Inoltre non è miscibile con calce, clorotalonil, dinocap, carbammati, trichlorfon, ciexatin, azociclotin, dicofol, poltiglia bordolese. Non miscelare con concimi fogliari (amminoacidi, microelementi, nitrato di calcio, alghe, ecc.). Utilizzare **CHEMOL PLUS** ad almeno 21 giorni di distanza da trattamenti con prodotti a base di: chinometionato, clorotalonil, diclofluanide, dinocap, zolfo, azociclotin, benzossimate, ciexatin, dicofol, dimetoato, fenbutatin ossido, propargite, tetradifon, trichlorfon. Utilizzare **CHEMOL PLUS** ad almeno 14 giorni di distanza da trattamenti con prodotti a base di captano.

Utilizzare **CHEMOL PLUS** ad almeno 7 giorni di distanza da trattamenti con prodotti a base di: dithianon, fenitrothion, metidathion, carbaril, ethiofencarb, pirimicarb e propoxur.

**FITOTOSSICITÀ:** In miscela con l'amitraz e soprattutto con le cultivar Decana, William e S.Maria, il prodotto può evidenziare la tipica cerchiatura prodotta dalla succitata molecola. Sulla cv. William non miscelare **CHEMOL PLUS** con Etofenprox. Visto l'elevato numero delle specie e cultivar da trattare ed i numerosi prodotti miscelabili, è consigliabile effettuare un saggio su piccole superfici prima dell'impiego su larga scala.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per tutte le colture eccettuate le floreali e le ornamentali.



## Confezioni:

Flacone da 1 l

Tanica da 5 l

Tanica da 25 l