

The FMC logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The letter 'F' is stylized with a horizontal bar extending to the left. The background of the entire advertisement is a close-up photograph of an olive branch with several green olives and dark green leaves, some showing signs of insect damage.

PROTECT FOR BETTER GROWTH

Spotlight Plus[®]

Erbicida

Il plus per la spollonatura e il diserbo dell'olivo



Spotlight Plus®

Erbicida

Caratteristiche

- Formulazione EO che migliora la distribuzione sul target e riduce la deriva
- Contemporanea azione spollonante ed erbicida
- Rapido assorbimento entro un'ora dal trattamento
- Erbicida PPO, meccanismo d'azione E secondo la classificazione HRAC
- Inserito nei disciplinari di difesa integrata
- Rapida azione di contatto
- Partner ideale del glifosate nel controllo delle infestanti difficili
- Favorevole profilo tossicologico ed ambientale

Modalità d'azione

Spotlight Plus® ha un'azione esclusivamente di contatto, ha un potente effetto dissecante sui tessuti verdi non lignificati

Grazie all'innovativa formulazione si fissa rapidamente alla vegetazione trattata e ne amplifica l'azione

È assorbito per via fogliare e agendo per contatto, blocca la crescita dei tessuti vegetativi, con sintomi che si manifestano entro pochi giorni dal trattamento (necrosi e successiva morte)

Attivato dalla presenza di luce: intervenire al mattino o comunque entro tre ore dal tramonto

PERCHÉ È IMPORTANTE ELIMINARE I POLLONI?

- Perché esercitano una competizione verso i tralci e le branche a frutto
- Perché sono rifugio per gli insetti dannosi o vettori di patologie
- Perché, se non eliminati durante il periodo primaverile-estivo, ostacolano e rendono più costose le operazioni colturali e la raccolta



Spotlight Plus®

Erbicida

Impiego come spollonante

- Intervenire prima che i polloni siano di lunghezza superiore ai 10 cm (prima della loro lignificazione)
- Intervenire alla dose di 0,3 litri per 100 litri d'acqua equivalenti a 0,9-1 l/ha di prodotto, assicurando un'adeguata bagnatura della vegetazione da trattare (300 l/ha di acqua)
- Formulazione specifica per trattamenti con l'utilizzo di ugelli antideriva

Spotlight Plus® elimina i polloni nel modo più rapido ed efficace, con grande risparmio di tempo, di mano d'opera e assenza di ferite al ceppo. La tabella che segue riassume i numerosi vantaggi della spollonatura con Spotlight Plus® rispetto a quella manuale.

	MANUALE	SPOTLIGHT PLUS®
Tempo		
Manodopera		
Costo ad ettaro		
Ferite		



Impiego come erbicida

- Erbicida di contatto ad ampio spettro su infestanti a foglia larga
- Ottima sinergia con diserbanti sistemici (glifosate, graminicidi, solfoniluree)
- Integre o rende più rapida l'azione degli erbicidi totali nei confronti di infestanti «difficili»
- Basse dosi d'impiego: 0,3 l/ha

Spotlight Plus® è attivo nei confronti di alcune importanti infestanti che non sono adeguatamente controllate dai prodotti sistemici (glifosate) quali:

Vilucchio	<i>Convolvulus arvensis</i>
Malva	<i>Malva sylvestris</i>
Porcellana	<i>Portulaca oleracea</i>
Acetosella	<i>Oxalis acetosella</i>
Erba morella	<i>Solanum nigrum</i>
Ortica	<i>Urtica dioica</i>
Coniza	<i>Conyza spp.</i>
Grespino	<i>Sonchus spp.</i>
Attaccamano	<i>Galium aparine</i>
Amaranto	<i>Amaranthus spp.</i>
Carota selvatica	<i>Daucus carota</i>
Erodio	<i>Erodium spp.</i>
Chenopodio	<i>Chenopodium album</i>



FMC

PROTECT FOR BETTER GROWTH

Spotlight Plus®

Erbicida

FINE INVERNO		PRIMAVERA		ESTATE		AUTUNNO	
Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Settembre	Ottobre	Novembre



Stasi vegetativo



Germogliamento



Mignolatura



Fioritura



Accrescimento frutto



Invaiaitura



Maturazione

Inverno

Primavera

Estate

Autunno

DISERBOSpotlight Plus® 0,3 l/ha
+
Glyphos® Ultra 2-3 l/ha**SPOLLONATURA***Spotlight Plus® 0,9-1 l/ha
(1-2 interventi)**DISERBO**Spotlight Plus® 0,3 l/ha
+
Glyphos® Ultra 2-3 l/ha

*Prima della spollonatura, durante la potatura di fine inverno, eliminare manualmente gli eventuali polloni lignificati dell'anno precedente.

COMPOSIZIONE

CARFENTRAZONE ETILE g 6,45 (=60 g/l)

FORMULAZIONE

EMULSIONE ACQUA/OLIO

CLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE

**REGISTRAZIONE**

N° 13466 del 25-02-2010

CONFEZIONIBottiglia da 1L (12x1)
Tanica da 5L (4x5)

USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI RICHAMA L'ATTENZIONE SULLE FRASI E SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA. Copyright © by FMC Corporation. Tutti i marchi con il simbolo ® sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di FMC Corporation o di sue società affiliate. Per composizione e numero di registrazione riferirsi al catalogo o al sito internet www.cheminova.it

Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo (BG) - Tel. +39 035 19904468 - Fax +39 035 19904471- info.it@fmc.com - www.cheminova.it