Piridane 480

NUOVA ETICHETTA

- INSETTICIDA FOSFORGANICO, AGISCE PER CONTATTO, INGESTIONE ED IN FASE DI VAPORE
- ELEVATO POTERE ABBATTENTE VERSO LARVE DI LEPIDOTTERI, NEANIDI DI COCCINIGLIE E CICALINE
- ADEGUATA PERSISTENZA

COMPOSIZIONE
clorpirifos 44,53% (480 g/l)

FORMULAZIONE
concentrato emulsionabile (EC)

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H226; H302; H304; H315; H319; H332; H335; H336; H410; EUH401

Pericolo

REG. MIN. SALUTE
n° 8649 del 31.01.1995

CODICE IRAC
1B

BUFFER ZONE
Consultare il riferimento della sezione dedicata (pag. 23)

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	MAX
Agrumi	Cocciniglie	110 ml/hl (1,65 l/ha)	Trattare alla fase di massima migrazione delle neanidi o, comunque, in presenza del parassita.	21 gg	2
	Aleurodide degli agrumi e Aleurodide fioccoso degli agrumi, Pezothrips kellyanus (azione collaterale)		Intervenire alla presenza dei parassiti		
	Formiche	220 ml/hl	Intervenire alla presenza del parassita irrorando la base del tronco ed il terreno		
Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone, Nashi	Carpocapsa, Torticidi ricamatori, Sesidi	110 ml/hl (1,65 l/ha)	Trattare alla schiusura delle uova. Intervenire solo fino alla fase di prefioritura o al più tardi allo stadio di frutticino appena formato.	90 gg	1
	Cocciniglie		Trattare alla fase di massima migrazione delle neanidi. Intervenire solo fino alla fase di prefioritura o al più tardi allo stadio di frutticino appena formato.		
	Psilla del biancospino, Cacopsylla perniciosa		Trattare alla presenza del parassita. Intervenire solo fino alla fase di prefioritura o al più tardi allo stadio di frutticino appena formato.		
	Rodilegno rosso, Rodilegno giallo		Trattare il tronco e i rami alla presenza delle prime larve neonate. Intervenire solo fino alla fase di prefioritura o al più tardi allo stadio di frutticino appena formato.		
	Afide lanigero del melo, Afide verde del melo e Afide grigio del melo (azione collaterale)		Trattare alla presenza del parassita. Intervenire solo fino alla fase di prefioritura o al più tardi allo stadio di frutticino appena formato.		
	Cidia, Mosca della frutta, Tentredini		Trattare alla presenza del parassita. Intervenire solo fino alla fase di prefioritura o al più tardi allo stadio di frutticino appena formato.		

Prodotto originale Dow AgroSciences

AVVERTENZE
Su Vite, Drupacee, Pomodoro e Peperone intervenire solo fino alla fase di prefioritura o alla formazione del pomo per i Cavoli a testa. Su Albicocco, Floreali ed Ornamentali si raccomandano saggi preliminari per accertarsi della selettività.

Piridane 480

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	MAX
Vite da tavola e da vino	Tignole	110 ml/hl (1,5 l/ha per Vite da vino, 1,35 l/ha per Vite da tavola)	Trattare alla comparsa delle prime larve.	Trattamento consentito solo in prefioritura	1
	Cicaline, Metcalfa		Trattare alla presenza del parassita.		
	Cocciniglie		Trattare alla fase di massima migrazione delle neanidi.		
Pesco, Nettarina	Cidia, Anarsia	110 ml/hl (1,65 l/ha)	Trattare alla schiusura delle uova.	Trattamento consentito solo fino alla fase di prefioritura	1
	Cocciniglie		Trattare alla fase di massima migrazione delle neanidi.		
	Mosca della frutta, Tripidi (azione collaterale)		Trattare alla presenza del parassita. Intervenire entro la fase di prefioritura.		
Barbabietola da zucchero	Altiche, Atomaria, Cleono, Afidi (azione collaterale), Nottue*	1 l/ha	Intervenire alla presenza del parassita	60 gg	1
Mais e Mais Dolce (non per alimentazione animale)	Piralide, Sesamia, Diabrotica, Tipula (azione collaterale), Nottue*	1-1,5 l/ha (max 1,5 l/ha)	Intervenire alla presenza del parassita	60 gg	1
Pomodoro da industria, Peperone	Lepidotteri, Dorifora, Afidi (azione collaterale), Nottue	750 ml/ha	Intervenire alla presenza dei parassiti. Su pomodoro e peperone trattare solo in prefioritura.	10 gg	1
Cavoli a testa (Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo rosso, Cavolo bianco), Cavoli a infiorescenza (Cavlfiore)	Lepidotteri fogliari, Nottue*	1 l/ha	Intervenire alla presenza dei parassiti. Per i Cavoli a testa eseguire il trattamento solo fino alla formazione del pomo.	21 gg	1
Colture Floreali ed Ornamentali (in pieno campo)	Tripidi, Tortricidi, Cocciniglie, Oziorrinchi, Aleurodidi, Nottue*	100 ml/hl (0,8 l/ha)	Intervenire alla presenza del parassita	n.p.	1

*Lotta contro le Nottue del terreno che infestano Barbabietola da zucchero, Mais e Mais dolce, Pomodoro da industria, Peperone, Melanzana, Cavoli a testa e ad infiorescenza, colture ornamentali e floreali – Trattamenti per irrorazione 0,75-1,5 l/ha – Distribuzione esche 25 ml/kg di esca a base di crusca e melasso: distribuire 50 kg/ha di esca.

FLACONE
1 litro (cartone 10 pz)

TANICA
5 litri (cartone 4 pz)