

Barracuda

BARRACUDA è un insetticida che agisce per contatto ed ingestione nei confronti di numerosi insetti adulti e negli stadi giovanili. Manifesta effetto rapido e persistente con bassi dosaggi d'impiego, risultando efficace anche

dopo repentine variazioni di temperatura. A dosaggi sub-letali presenta collaterale azione repellente.

COMPOSIZIONE Cipermetrina pura 5,0 % (= 45 g/l)
FORMULAZIONE Concentrato emulsionabile
REG. MIN. SALUTE N° 12115 del 27.04.2004

CLASSIFICAZIONE



(H302; H304; H410)

1 l - 5 l



INTERVALLO DI SICUREZZA 7 gg per Pisello, Fagiolino, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Cavolfiore, Cavolo broccolo; 14 gg per Melo, Pero, Limone, Arancio, Pesco, Ciliegio, Cipolla, Patata; 21 gg per Barbabietola da zucchero e Pomodoro; 28 gg per Vite, Mais; 42 gg per Frumento; 60 gg per Tabacco.

SETTORI DI IMPIEGO:

COLTURA	DOSE ml/hl	AVVERSITÀ	NOTE
DRUPACEE (Pesco, Ciliegio)	75-100	Contro Afidi	Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari è consigliato un trattamento con BARRACUDA a 100-150 ml/hl con Olio bianco a 1,5 kg/hl allo stadio vegetativo di bottoni rosa.
	100-150	Contro Anarsia, Cidia, lepidotteri in genere	
	100-150	Contro Cocciniglie: neanidi nei trattamenti estivi	
	100-150	Contro Tripidi, Mosca	
POMACEE (Melo, Pero)	100-150	Contro Psilla: 1° trattamento a fine inverno contro adulti svernanti	Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari si consiglia un trattamento con BARRACUDA a 100-150 ml/hl in miscela con Olio bianco a 2-3 kg/hl allo stadio compreso tra le orecchiette di topo e la differenziazione dei mazzetti. Su foglie non accartocciate. Contro la prima generazione allo stadio di uova mature prima della comparsa delle mine. In trattamenti estivi.
	150	2° trattamento sulle uova mature prodotte dalla prima generazione all'apparire delle prime neanidi	
	200	Con l'inizio della melata	
	200-300	3° trattamento (facoltativo) contro 3ª generazione 200-300 ml/hl	
	75-100	Contro Afidi	
	100-150	Contro Fillominatori (Cemiostoma, Litocolletis)	
	100-150	Contro Ricamatrici estive e Lepidotteri	
	100-150	Contro Carpocapsa e neanidi delle Cocciniglie	
ORTAGGI in pieno campo e serra (Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Fagiolino, Pisello, Pomodoro, Cipolla, Patata)	100-150	Contro Dorifora, Afidi, Cavolaia, Tripidi, Piralide, Nottue (scoperte)	
	75-100	Contro Mosca bianca	
VITE	100-150	Conto Tignola, Tignoletta	Prima e seconda generazione
	100-125	Contro Cocciniglie, Sigaraio	
AGRUMI (Limone, Arancio)	75-100	Contro Afidi	In trattamenti estivi.
	100-150	Contro neanidi delle Cocciniglie	
	100-150	Contro Mosca bianca e Mosca degli agrumi	

Barracuda

COLTURA	DOSE ml/ha	AVVERSITÀ	NOTE
TABACCO	75-100	Contro Afidi e Mosca bianca	
	100-150	Contro Nottue (allo scoperto) e Tripidi	
BARBABIETOLA da zucchero	1000-1200 ml/ha	Contro Altica	
	500-600 ml/ha	Contro Afidi	
	600-1000 ml/ha	Contro Nottue (allo scoperto)	
	800-1000 ml/ha	Contro Cleono, Lisso, Cassida	
MAIS	75-100	Contro Afidi	
	100-150	Contro Piralide	
FRUMENTO	75-100	Contro Afidi e Lema	

AVVERTENZE:

Le dosi sopra citate si riferiscono a volume normale nei trattamenti. Per trattamenti a volume ridotto mantenere invariate la dose per ettaro. In caso di forti infestazioni impiegare le dosi più alte. Bagnare accuratamente tutte le parti della pianta. Non trattare durante la fioritura.

