

# Gremmy

Fungicida sistemico che può essere impiegato sia preventivamente che curativamente. Agisce all'interno della pianta inibendo la formazione degli

austori del fungo. L'assorbimento del prodotto da parte degli organi verdi è molto rapido e termina in circa 30 minuti.

**COMPOSIZIONE** Ciproconazolo puro 10 %  
**FORMULAZIONE** Granuli idrodispersibili  
**REG. MIN. SALUTE** N° 12185 del 13.07.2006

## CLASSIFICAZIONE

0,2 kg



(H361; H411)



**INTERVALLO DI SICUREZZA** 14 gg per Vite, Albicocco, Mandorlo e Carciofo; 10 gg per Pomodoro; 7 gg per Susino, Pisello, Melo e Pero; 3 gg per Pesco.

## SETTORI DI IMPIEGO:

| COLTURA    | DOSE g/hl   | AVVERSITÀ                    | NOTE   |
|------------|-------------|------------------------------|--|
| VITE       | 10-12,5     | Contro Oidio                 | Ogni 14 giorni. In situazioni di forte pressione della malattia ed in particolare su uva da tavola a partire dalla fioritura la dose può essere aumentata fino a 15 g/hl adottando un intervallo di 10-14 giorni. In zone di forte pressione della malattia e su uva da tavola utilizzare il prodotto ad una dose non inferiore a 12,5 g/hl, indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati.   |
|            | 20          | Contro Muffa grigia          | Effettuare il trattamento in pre-chiusura del grappolo ed in pre-raccolta. Ha effetto collaterale contro il marciume acido.  |
|            | 10 g/pianta | Contro Mal dell'esca         | Diluiti in 10 litri di acqua, per un massimo di 50 piante per ettaro. Impiegare Gremmy su piante con sviluppo normale, che non siano già compromesse dalla malattia e che abbiano un apparato vascolare efficiente. Intervenire quindi: <ul style="list-style-type: none"><li>• su piante che presentino al massimo il 30% delle foglie colpite da manifestazione classica del mal dell'esca</li><li>• su vigneti di non oltre 15 anni di età</li><li>• subito dopo la manifestazione della malattia e comunque entro 3 anni dalla prima comparsa della sintomatologia fogliare del vigneto. Il prodotto va applicato al terreno col palo iniettore in corrispondenza delle radici assorbenti, ad una profondità di 10-15 cm. Epoca di applicazione: alla ripresa vegetativa con germogli di 5-20 cm di lunghezza. Il trattamento non garantisce il completo risanamento delle piante, ma è in grado, di produrre un contenimento significativo dei sintomi fogliari ed un prolungamento della vita produttiva della piante.</li></ul> |
| MELO, PERO | 12,5        | Contro Ticchiolatura e Oidio | Da adoperarsi in miscela con prodotti di contatto, intervenendo all'inizio della caduta petali. Contro Ticchiolatura tardiva e Monilia impiegare Gremmy in funzione delle piogge alla dose di 15-20 g/hl fino a 7 giorni dalla raccolta.   |

# Gremmy

| COLTURA                                       | DOSE g/ha      | AVVERSITÀ                      | NOTE  |
|---|----------------|--------------------------------|---|
| DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Susino, Mandorlo) | 10-12,5        | Contro Oidio e Ruggine         | Ogni 12-14 giorni, iniziando i trattamenti dopo la caduta dei petali. Contro Monilia: 10-12,5 g/ha. Nei trattamenti ai bottoni rosa, in fioritura (come in caso di piogge persistenti), alla sfioritura, si consiglia di miscelare Gremmy con prodotti a base di Tiram, benzimidazolici, Ditanon a dosi ridotte. Nei trattamenti ad 1-2 settimane dalla raccolta, impiegare Gremmy da solo alla dose di 12,5 g/ha, elevandola a 20 g/ha in condizioni di forte pressione della malattia. Contro Ruggine 12,5 g/ha iniziando la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia. |
| ASPARAGO                                      | 250-300 g/ha   | Contro Ruggine                 | Iniziare la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia sull'apparato aereo delle piante madri trattando ogni 14-15 giorni.   |
| CARCIOFO                                      | 125-150 g/ha   | Contro Oidio                   | Intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.   |
| PISELLO                                       | 100-125 g/ha   | Contro Oidio                   | Intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.   |
| POMODORO                                      | 10-12,5        | Contro Cladosporiosi e Oidio   | Intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.   |
| FIORI E ORNAMENTALI                           | 10-15<br>20-30 | Contro Oidio<br>Contro Ruggini |   |

## AVVERTENZE:

Tutte le dosi indicate si riferiscono alla distribuzione con pompe a volume normale, tale da assicurare una uniforme e completa bagnatura.

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Evitare che le donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

