SYSTHANE™ 4,5 PLUS

FUNGICIDA SISTEMICO ANTIOIDICO PER COLTURE ARBOREE ED ORTIVE

COMPOSIZIONE
Miclobutanil 4,5 % (45,5 g/l)

FORMULAZIONE
Emulsione acquosa

REGISTRAZIONE
n. 13138 del 03/08/2006

AVVERTENZA
PERICOLO

CONFEZIONE
1 L (12 x 1 L)

TM Marchio di The Dow Chemical Company (DOW) o filiali di DOW

SYSTHANE™ 4,5 PLUS è un fungicida endoterapico ad attività preventiva, curativa ed eradicante. È un formulato a base di miclobutanil in emulsione acquosa che si caratterizza per essere rapidamente assorbito dalla pianta e traslocato nei tessuti.
SYSTHANE™ 4,5 PLUS è efficace contro oidio su vite, fruttiferi, ortive e rosa. Mostra una buona efficacia di contenimento anche nei confronti di agenti di Moniliosi su drupacee, marciume nero su vite e di ruggine su garofano.
SYSTHANE™ 4,5 PLUS è ideale per le strategie antiresistenza ed in miscela con fungicidi di contatto assicura una completa protezione della coltura.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	INTERVALLO SICUREZZA	NOTE
VITE DA VINO E DA TAVOLA	Oidio Marciume nero	100-150 ml/hl	15 gg	Iniziare gli interventi in presenza di vegetazione recettiva alla malattia e in via preventiva. Proseguire ad intervalli di 10-12 giorni utilizzando una dose di 100-125 ml/hl. Dopo l' allegagione intervenire a 125ml/ hl a turni di ogni 8-12 giorni in funzione dell' andamento stagionale e della sensibilità varietale. In caso di forte pressione della malattia impiegare Systhane 4,5 plus a 150ml/hl a turni di 8-10 giorni.
MELO, PERO	Oidio			Iniziare i trattamenti alla comparsa delle orecchiette di topo e proseguendo ogni 8-12 giorni a seconda della fase vegetativa e dell'intensità della malattia.
PESCO, NETTARINE, SUSINO, ALBICOCCO	Oidio Monilia del fiore e del frutto	125-150 ml/hl	7 gg	Per il controllo dell'oidio trattare dalla sfioritura per 2-3 volte ogni 8-12 giorni. Per la monilia del fiore trattare a bottoni rosa e a caduti petali. Per la monilia del frutto effettuare 2 interventi in pre raccolta ad un intervallo di 6-7 giorni.
MELONE, ANGURIA ZUCCHINO, CETRIOLO, ZUCCA	Oidio		3 gg	Iniziare i trattamenti in maniera preventiva e non oltre la prima comparsa dei sintomi. Alternare con prodotti a diversi meccanismo di azione e adottare turni di intervento di 8-12 giorni in funzione della pressione della malattia.
POMODORO, PEPERONE, CARCIOFO				
FRAGOLA				
ROSA	Oidio, Ticchiolatura	100-125 ml/hl	-	Intervenire dalla comparsa dei sintomi ogni 8-12 giorni. Impiegare la dose massima e intervalli minori in caso di forte pressione della malattia.
GAROFANO	Ruggine		-	