

KUKAR®



Insetticida ad azione per contatto, ingestione e inalazione

Kukar® è un insetticida fosfororganico che agisce per contatto, ingestione e in parte per azione di vapore. Indicato per il controllo di lepidotteri, cocciniglie e cicaline, si inserisce attivamente nei programmi di gestione delle resistenze nei confronti degli insetticidi ad azione specifica.

Vantaggi

Ampio spettro d'azione.

Compatibilità

Il prodotto non è miscibile con formulati alcalini.

Avvertenze

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare sulle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività.

Fitotossicità

Non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman red, Stayman winesap, Gloster, Gallia beauty.

Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (L/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
Pomacee	Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	3	Intervenire nel periodo compreso fra la fase finale di accrescimento del frutto e la piena invaiatura.	1	15 gg.
Drupacee	Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	3	Intervenire nel periodo compreso fra la fase finale di accrescimento del frutto e la piena invaiatura.	1	15 gg.
Vite (da vino e da tavola)	Cicaline (<i>Scaphouideus titanus</i> , <i>Empoasca vitis</i> , <i>Empoasca flavescens</i> , <i>Zygina rhamni</i>)	1	Intervenire da allegagione a inizio maturazione.	1	21 gg.
	Tignole (<i>Lobesia botrana</i> , <i>Eupoecilia ambiguella</i> , <i>Argyrotaenia pulchellana</i>)	1,2	Intervenire da fioritura a inizio maturazione.		
Agrumi	Cocciniglie (<i>Icerya purchasi</i> , <i>Planococcus citri</i> , <i>Ceroplastes sp.</i> , <i>Saissetia oleae</i> , <i>Aonidiella auranti</i>)	4,5	Intervenire indicativamente nel periodo compreso tra giugno e agosto in cui si verifica la migrazione delle neanidi. Nei confronti di pseudococcus si consiglia di intervenire nel periodo compreso fra agosto e settembre.	1	15 gg.
	Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	4,5	Intervenire nel periodo compreso fra l'inizio dell'invaiatura e la piena invaiatura.		

Consultare l'etichetta anche per le fasce di rispetto non trattate e il volume d'acqua da impiegare



INSETTICIDI

Composizione

Clorpirifos-metile (224 g/l) 22,4%

Formulazione

Emulsione concentrata

Confezioni

1 L

5 L

Registrazione

in corso



PERICOLO

Kukar®:
marchio registrato Gowan Italia.