



# CATOR

INSETTICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE  
IN CONCENTRATO EMULSIONABILE

- Agisce per contatto, ingestione e, più limitatamente, per asfissia.
- Possiede proprietà translaminari, in quanto penetra e si diffonde all'interno degli strati superficiali dei tessuti vegetali.
- È altamente efficace nei confronti di numerose specie fitofaghe di Lepidotteri, Ditteri, Omotteri e Coleotteri.



Applicazione  
sulla pianta



## COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

CLORPIRIFOS\* g 44,53 (= 480 g/l)  
(\* Prodotto originale DOW AgroSciences)



## REGISTRAZIONE

n. 8155 del 30/12/1992



## CLASSIFICAZIONE

CLP



H226, H302, H304, H315, H319, H332, H335, H336, H410



## FORMULAZIONE

Emulsione concentrata



## CONFEZIONI

1 litro (Cartone: 12x1) - 5 litri (Cartone: 4x5)



## CARENZA

**90 giorni** pomacee, **60 giorni** barbabietola e mais, **21 giorni** agrumi e cavoli, **10 giorni** pomodoro e peperone.



## MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Il prodotto non è miscibile con prodotti a reazione alcalina quali polisolfuri e solfati di rame basici.



## COLTURE



## PATOGENI



## DOSE



## NOTE

AGRUMI	Aleurodidi, Neanidi di Cocciniglie Formica argentina	110 ml/hl 220 ml/hl	Irrorazioni al terreno e base tronco; massimo 2 trattamenti/anno. Non utilizzare durante la fioritura.
COTOGNO, NESPOLO DEL GIAPPONE, MELO, NASHI, PERO	Carpocapsa, Ricamatori, Psilla, Sesia, Neanidi di Cocciniglie, Rodilegno e Afide Lanigero	110 ml/hl	Massimo 1 trattamento/anno. Consentito entro fine prefioritura o al più tardi frutticino appena formato.
PESCO, NETTARINA	Cidia, Anarsia, Mosca, Neanidi di Cocciniglie Tripidi	110 ml/hl	Massimo 1 trattamento/anno. Consentito entro fine prefioritura.
VITE (tavola e vino)	Tignole, Cicaline, Cocciniglie	110 ml/hl	Massimo 1 trattamento /anno. Consentito solo in prefioritura.
POMODORO da Industria e Peperone	Dorifora, Lepidotteri	750 ml/Ha	Massimo 1 trattamento /anno. Consentito solo in prefioritura.
MAIS	Piralide, Sesamia, Diabrotica	1,0-1,5 l/Ha	Quantitativo massimo 1,5l/ha . Massimo 1 trattamento /anno.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Altica, Cleono, Nottue	1 l/ Ha	Massimo 1 trattamento /anno.
FLOREALI e ORNAMENTALI (in pieno campo)	Tripidi, Tortricidi, Oziorrinchi, Cocciniglie, Aleurodidi	100 ml/hl	Quantitativo massimo 0,8 l/Ha. Massimo 1 trattamento /anno.
CAVOLI A TESTA (CAPPUCCIO, VERZA, CAVOLO ROSSO CAVOLO BIANCO) E A INFIORESCENZA (CAVOLFIORE)	Lepidotteri fogliari	1 l/ Ha	Massimo 1 trattamento /anno. Su cavoli a testa eseguire trattamento fino a formazione pomo.
MAIS e MAIS DOLCE, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, POMODORO da Industria, PEPPERONE, MELANZANA, CAVOLI A TESTA E A INFIORESCENZA, FLOREALI e ORNAMENTALI	Lotta alle Nottue del terreno	750 -1500 ml/Ha  25 ml/kg esca	Applicazioni per irrorazione con 800-1000 litri acqua/Ha.  Distribuire 50 Kg/Ha di esca. Distribuire le esche nelle ore fresche della giornata. Usare esche a base di crusca e melassa miscelati.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.