



Roxy[®] 800 EC

Campo libero dalle infestanti per Orzo e Frumento



BELCHIM
CROP PROTECTION

Roxy[®] 800 EC

- Ottima efficacia su infestanti sensibili e resistenti (*)
- Ampio spettro d'azione sulle graminacee infestanti
- La soluzione vincente per la gestione delle infestanti difficili nella rotazione colturale



Entra nel mondo Belchim
Scarica la nostra APP

- SCOPRI IL CATALOGO PRODOTTI
- ACCEDI AD EVENTI ESCLUSIVI
- TIENITI AGGIORNATO CON LE NOSTRE NEWS



Poa



Loietto



Alopecuro



Bromo



Falaride



Avena



Veronica

Roxy[®] 800 EC è un erbicida di pre emergenza ad azione radicale e meristemica sui semi in fase di germinazione, appartenente alla famiglia dei tiocarbammati poco presente nel diserbo delle grandi colture. Roxy[®] 800 EC costituisce una base inevitabile per la lotta alle graminacee resistenti agli erbicidi inibitori della ALS e di ACCase (FOP).

Perché privilegiare il diserbo preventivo di pre-emergenza ?

- Per limitare la competizione e la concorrenza delle infestanti con la coltura sin dalle prime fasi di crescita nei momenti cruciali dell'impianto dei cereali.
- Per sopperire alla minore efficacia dei trattamenti di post-emergenza della coltura, in presenza di elevate infestazioni o di casi di resistenza ad erbicidi di post-emergenza.

Posizionamento del prodotto

Per una performance ottimale, Roxy[®]800 EC si applica dallo stadio di pre-emergenza allo stadio di 2-3 foglie vere della coltura.

Selettività e dosi di impiego

	Grano tenero	Grano duro	Orzo
Roxy [®] 800 EC	3,8- 4 l/ha	3,8-4 l/ha	3,8 l/ha
Roxy [®] 800 EC + Diflufenican	3,5+ 0,25 l/ha	3,5 + 0,25 l/ha	2,5+ 0,2l/ha
Roxy [®] 800 EC + Chlortoluron	*	Applicazioni frazionate	

■ Ottima selettività ■ Buona selettività

* Leggeri sintomi di fitotossicità possono comparire in alcuni casi con semi scoperti o situazioni di ristagni di pioggia e di applicazioni difficili. Per tutti gli altri casi dubbi consultate il vostro tecnico così come per miscele diverse da quelle indicate.

Raccomandazioni d'impiego

- Roxy[®] 800 EC si applica su terreno ben preparato su semente ben coperta e senza granella in superficie.
- L'applicazione in post-emergenza non è raccomandata su terreno molto bagnato, sabbioso o con più del 70 % di sabbia. Lievi ingiallimenti possono comparire sulle foglie senza che ci siano conseguenze sulla resa finale della coltura.
- Non trattare su terreno asfittico o su coltura sofferente.
- Non conviene trattare se si prevede un lungo periodo piovoso dopo l'applicazione,
- Se esiste un rischio di forti gelate o di grandi sbalzi termici.

Profilo Prodotto

Composizione: Prosulfocarb 800 g/L

Reg. Ministero della Salute: N. 14749 del 29/05/2014

Meccanismo d'Azione: HRAC N

Formulazione: Concentrato Emulsionabile (EC)

CLP:

Dose d'impiego: 3,8 - 4 l/ha su Frumento e Orzo
5 l/ha Segale, Triticale e Patata.

Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



Belchim Crop Protection Italia S.p.A.

Centro Direzionale Milanofiori | Strada 6 Palazzo N 3 | 20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 33599422 · 02 33576501 · Fax 02 87152284 | www.belchim.it