

Insetticida ad ampio spettro d'azione a base di metomil




Colture	Principali parassiti controllati	Dosi	N° max tratt. annui	Int. di sicurezza
Pomodoro, melanzana (in pieno campo ed in coltura protetta)	<i>H. armigera</i> , <i>O. nubilalis</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>T. absoluta</i> , <i>M. persicae</i> , <i>A. gossypii</i> , <i>B. tabaci</i> , <i>T. vaporariorum</i> .	1 Kg/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha	2	7 giorni
Cetriolo, cetriolino, zucchino (in pieno campo ed in coltura protetta)	<i>H. armigera</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>A. gossypii</i> , <i>B. tabaci</i> , <i>T. vaporariorum</i> .	1 Kg/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha	2	21 giorni in serra 14 giorni in pieno campo
Lattuga (cappuccia, romana, iceberg, lollo rosso) e spinacio (entrambe solo in pieno campo)	<i>H. armigera</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>M. brassicae</i> , <i>M. persicae</i> , <i>N. ribis-nigri</i>	1 Kg/ha con volumi d'acqua compresi fra 3 e 8 hl/ha (tra 5 e 10 hl/ha per spinacio)	2	21 giorni
Fagioli con baccello e Piselli con baccello (entrambe solo in pieno campo)	<i>H. armigera</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>A. fabae</i> .	1 Kg/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 6 hl/ha	2	10 giorni
Tabacco (solo in pieno campo)	<i>H. armigera</i> , <i>M. nicotianae</i> , <i>M. persicae</i> , <i>T. tabaci</i> .	1 Kg/ha con volumi d'acqua compresi fra 3 e 6 hl/ha	2	21 giorni
Peperone (in pieno campo ed in coltura protetta)	<i>H. armigera</i> , <i>O. nubilalis</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>T. absoluta</i> , <i>M. persicae</i> , <i>A. gossypii</i> , <i>B. tabaci</i> , <i>T. vaporariorum</i> .	1 Kg/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha	2	21 giorni in serra 14 giorni in pieno campo
Melone, Cocomero e Zucca (in pieno campo ed in coltura protetta)	<i>H. armigera</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>A. gossypii</i> , <i>B. tabaci</i> , <i>T. vaporariorum</i> .	1 Kg/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha (tra 3 e 6 hl/ha per melone)	2	28 giorni

CARATTERISTICHE:

Lannate® 25 WP è un insetticida carbammato citotropico per il controllo di larve ed adulti di alcuni insetti che attaccano le colture ortive (in pieno campo ed in ambiente protetto) ed il tabacco.



Registrazione: N° 14894 del 10/05/2012 del Ministero della Salute

**COMPOSIZIONE:**

Metomil puro g 25
Coformulanti q. b. 100 g

FORMULAZIONE:

Polvere bagnabile
in sacchetto idrosolubile

CONFEZIONE:

Scatola da 1 kg
(5 sacchetti idrosolubili da 200 g)

CLASSIFICAZIONE:

PERICOLO

GRUPPO IRAC

1A

INSETTICIDI