



ZOLFO SC

ANTICRITTOGAMICO PER LA LOTTA CONTRO
LE MALATTIE FUNGINE SENSIBILI ALLO ZOLFO.
SOSPENSIONE CONCENTRATA.



DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Patologia	Note	Dosi (l/ha)	Volume d'acqua (l/ha)
VITE	Oidio (<i>Erysiphe necator</i>)	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare massimo 8 trattamenti intervenendo ogni 7 giorni (intervallo minimo).	3-4	500-1000
POMACEE	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>), Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i> , <i>Phyllactinia mali</i>), Eriofidi (<i>Eriophyes pyri</i>)	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare massimo 8 trattamenti intervenendo ogni 7 giorni (intervallo minimo).	3-4	500-1500
DRUPACEE	Oidio (<i>Podosphaera sp.</i>), Bolla (<i>Taphrina deformans</i>)	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare massimo 8 trattamenti intervenendo ogni 7 giorni (intervallo minimo).	3-4	500-1500
NOCCIOLO	Oidio (<i>Phyllactinia corylicola</i>), Eriofidi (<i>Phytoptus avellanae</i>)	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare massimo 8 trattamenti intervenendo ogni 7 giorni (intervallo minimo).	3-4	500-1500
POMODORO E ALTRI ORTAGGI A FRUTTO (Solanacee, Cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile) in pieno campo e serra	Oidio (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Golovinomyces sp.</i> , <i>Podosphaera sp.</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare massimo 6 trattamenti intervenendo ogni 10 giorni (intervallo minimo).	2	400-1500
CAVOLI, ORTAGGI A STELO IN CAMPO	Oidio (<i>Erysiphe cruciferarum</i> , <i>Leveillula taurica</i>)	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare massimo 6 trattamenti intervenendo ogni 10 giorni (intervallo minimo).	2	400-1500
LEGUMI FRESCHI E DA GRANELLA IN CAMPO	Oidio (<i>Erysiphe pisi</i>)	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare massimo 6 trattamenti intervenendo ogni 10 giorni (intervallo minimo).	2	400-1500
FLOREALI E ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO E SERRA, FORESTALI	Oidio (<i>Sphaerotheca spp.</i> , <i>Oidium chrysanthemi</i> , <i>Microsphaera spp.</i> , <i>Leveillula spp.</i> , <i>Erysiphe spp.</i> , <i>Phyllactinia sp.</i> , <i>Podosphaera sp.</i>)	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare massimo 5 trattamenti intervenendo ogni 10 giorni (intervallo minimo).	3	450-1500
CEREALI	Oidio (<i>Blumeria graminis</i>)	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare massimo 4 trattamenti con cadenza di 10 giorni (intervallo minimo).	8-10	150-500


COMPOSIZIONE

ZOLFO puro g 56,09 (=800 g/l)
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g. 100

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

CONFEZIONE



COLORAZIONE

Non colorato

CLASSIFICAZIONE

MISCIBILITÀ

Non è compatibile con prodotti fitosanitari alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con oli minerali, con Captano e prodotti contenenti solventi organici di origine vegetale.

TEMPO DI CARENZA

5 gg. vite, pomacee, drupacee, nocciolo, cereali
3 gg. pomodoro, ortaggi a frutto (solanacee, cucurbitacee a buccia commestibile e non commestibile), cavoli, ortaggi a stelo, legumi freschi e da granella

REGISTRAZIONE

N. 15313 del 19.12.2011