

# CheckMate® OFM-F

per Cydia

Scheda tecnica

Suterra®



Tecnologia di rilascio di feromoni a spray per il controllo della Cydia

## CheckMate® OFM-F per Cydia

CheckMate® OFM-F è un nuovo prodotto migliorato per la confusione sessuale per il controllo della Cydia nelle colture di pomacee e drupacee. Utilizza la formula microincapsulata, di proprietà di Suterra, per garantire una maggiore durata e flessibilità nel frutteto.

CheckMate® OFM-F è un prodotto facile da distribuire che rilascia ininterrottamente per tutto il frutteto il feromone sessuale della Cydia. Si riduce così la capacità dei maschi adulti di trovare le femmine, interrompendo il ciclo di accoppiamento e diminuendo le popolazioni di parassiti. Si può miscelare in un serbatoio con molti prodotti agrochimici comuni e usare come componente integrante di un programma di gestione integrata delle specie nocive. Il prodotto è anche molto più sicuro per i lavoratori rispetto a molti trattamenti a base di insetticidi, con intervalli minimi di riapplicazione e pre-raccolta.

CheckMate® OFM-F può essere particolarmente efficace se combinato con altri prodotti di Suterra® come CheckMate® CM XL Dispenser™ e CheckMate® Puffer® CM-O. Tutti i prodotti di Suterra CheckMate® contro la Cydia sono innocui per altri organismi viventi e insetti utili.

## Caratteristiche e vantaggi

- Formula liquida facile da usare
- Miscelabile in un serbatoio con prodotti agrochimici comuni
- Compatibile con tecniche di gestione integrata delle specie nocive
- Innocuo per gli insetti utili
- Basso rischio di esposizione per i lavoratori
- Intervalli minimi di riapplicazione e pre-raccolta
- Spesso utilizzato in combinazione con altri prodotti di Suterra® contro la Cydia

## Tabella con dettagli su CheckMate® OFM-F

Parassita bersaglio	Cydia <i>Grapholita molesta</i> .
Registrazioni di colture	Pesco ed altre drupacee; melo ed altre pomacee e colture in cui è presente la Cydia.
Monitoraggio e rilevazione	Monitorare l'efficacia della confusione sessuale usando trappole "delta" con OFM BioLure®.  Monitorare le popolazioni totali in trappole separate con la combinazione di caironi e feromoni come esca.  Appendere le trappole all'inizio della stagione 1 set di trappole per 4-10 ettari; almeno 2 trappole per blocco.  Controllare le trappole settimanalmente, sostituendo le esche ogni 8 settimane.  Sostituire le basi delle trappole in base alle necessità per garantire che rimangano appiccicose.  Danni visibili ai frutti si verificano solitamente alla fine di ogni attacco della Cydia.
Danni per Cydia	Perdite di raccolto dovute alle larve che si nutrono dei frutti.

Suterra Europe Biocontrol - Plaza América 2, 9ª Planta, 46004, Valencia - Spain

Tel: +34 96 395 67 43 | [cssales@suterra.com](mailto:cssales@suterra.com) | [www.suterra.com](http://www.suterra.com)

© 2018 Suterra LLC, USA. Tutti i diritti riservati. CheckMate®, Flowable™ e Suterra® sono marchi registrati di Suterra® LLC, USA. Utilizzare i prodotti fitosanitari in modo sicuro. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Suterra®

# CheckMate® OFM-F


per Cydia

Scheda tecnica

Suterra®

## Panoramica dell'applicazione

- Agitare bene prima dell'uso
- Non utilizzare pompe peristaltiche o ad ingranaggi
- Applicare sulla chioma
- Usare reti metalliche da 50 µm o di maggiori dimensioni
- Riapplicare dopo forti piogge



## Inibizione con trappola per Cydia

Pesca

CheckMate® OFM-F ha dimostrato di compromettere la capacità dei maschi di trovare le trappole a feromoni rispetto alle aree non trattate nello stesso periodo di tempo.



CheckMate® OFM-F è stato efficace nel catturare con frequenza i parassiti nelle trappole, riducendone notevolmente le popolazioni.

## Riduzione dei danni

Pesca

CheckMate® OFM-F mostra una riduzione dei danni ai frutti rispetto alle aree non trattate nello stesso periodo di tempo e un miglioramento del 80% alla raccolta di frutti.

● Riferimento senza confusione sessuale ● OFM-F



## Identificazione della Cydia

*Grapholita molesta*



Danni ai frutti per Cydia



Larva di Cydia in un frutto



Cydia adulta

Suterra Europe Biocontrol - Plaza América 2, 9ª Planta, 46004, Valencia - Spain

Tel: +34 96 395 67 43 | [cssales@suterra.com](mailto:cssales@suterra.com) | [www.suterra.com](http://www.suterra.com)



© 2018 Suterra LLC, USA. Tutti i diritti riservati. CheckMate®, Flowable™ e Suterra® sono marchi registrati di Suterra® LLC, USA. Utilizzare i prodotti fitosanitari in modo sicuro. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

