

MAGIÒ®

Erbicida selettivo di post-emergenza per il controllo delle infestanti graminacee annuali e poliennali

Magiò® è un erbicida graminicida di post-emergenza ad azione di contatto e per assorbimento fogliare. È specificamente indicato per il controllo delle infestanti annuali e poliennali sulle quali è attivo in qualsiasi stadio vegetativo.

Vantaggi

Vasto campo di applicazione. Elevata attività erbicida. Selettivo per le colture autorizzate.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.

Resistenze

Per evitare il diffondersi di fenomeni di resistenza, il prodotto va impiegato esclusivamente per il controllo di infestanti in attiva crescita, nei primi stadi di sviluppo e non sottoposte a stress (siccità, ristagno idrico o condizioni atmosferiche). Attuare strategie per la gestione delle resistenze che prevedano l'impiego di erbicidi aventi differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici di contenimento delle infestanti.

La selezione esercitata dall'uso ripetuto di erbicidi aventi il medesimo meccanismo d'azione, anche in condizioni non idonee, ha determinato la comparsa di popolazioni locali di malerbe resistenti. Si consiglia di effettuare saggi preliminari e/o contattare un tecnico locale.

Avvertenze

In relazione all'andamento stagionale, l'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni.

Dopo un trattamento con MAGIÒ è possibile seminare o trapiantare senza limitazioni tutte le colture in normale successione agronomica ed in rotazione. In caso di necessità di sostituzione delle colture trattate, effettuare un'aratura profonda prima di seminare o trapiantare la nuova coltura; si sconsiglia la semina di cereali.

Infestanti controllate

GRAMINACEE ANNUALI:

Avena (*Avena spp.*), Coda di topo (*Alopecurus spp.*), Fienarola (*Poa annua*), Giavone (*Echinochloa spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), Pabbio (*Setaria spp.*), Sanguinella (*Digitaria spp.*), Scagliola (*Phalaris spp.*).

GRAMINACEE POLIENNALI:

Agropiro comune (*Agropyron repens*), Gramigna comune (*Cynodon dactylon*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*).

Modalità d'impiego

Effettuare una sola applicazione all'anno, impiegando la dose più bassa per il controllo delle infestanti nei primi stadi di sviluppo e le dosi più elevate per il controllo delle infestanti entro lo stadio di pieno accostamento.

Colture	Dosi (L/ha)	Epoche d'impiego	Periodo carenza
Vite*, Melo, Pero, Cotogne, Nespole, Nespole del Giappone, Pesco, Nettarino	1-3	Prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica.	30 gg. *Vite: 45 gg.
Agrumi, Albicocco, Susino, Ciliegio, Frutta a guscio	1-3	Trattare in assenza di frutti.	-
Cavoli a testa, Cavolfiore, Broccolo	1-3	Dal superamento della crisi di trapianto.	30 gg.
Pomodoro, Melanzana	1-3	Dal superamento della crisi di trapianto fino ad allegagione.	30 gg.
Colza	1-3	Entro la chiusura della fila.	100 gg.
Tabacco	1-3	Fino al termine dell'allungamento degli internodi.	40 gg.
Patata	1-3	Entro la chiusura della fila.	30 gg.
Erba Medica, Trifoglio, Veccia	1-3	Entro la chiusura della fila.	-
Lino, Cotone	1-3	Trattamenti di post-emergenza e prima che le parti eduli della coltura si siano formate.	-
Soia, Girasole, Barbabietola da zucchero, barbabietola rossa e da foraggio	1-2,5	Trattare entro la chiusura della fila.	60 gg.
Cipolla, Aglio, Scalogno, Carota, Rapa, Ravanella	1-2,5	Fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del bulbo o del fittono.	30 gg.
Fagiolo e Pisello (consumo fresco), Fagiolino, Fava, Favino	1-2,5	Fino al termine dell'allungamento degli internodi o entro la chiusura della fila.	42 gg.
Fagiolo e Pisello (consumo secco), Cece, Lenticchia	1-2,5	Fino al termine dell'allungamento degli internodi o entro la chiusura della fila.	30 gg.
Ornamentali, Vivai, Forestali	1-3	Trattamenti di post-emergenza delle malerbe, ammessi solo mediante l'impiego di attrezzature schermate.	-
Cardo (uso non alimentare)	1-2	Entro la chiusura della fila.	-

Consultare l'etichetta anche per i volumi d'acqua da impiegare e le fasce di rispetto non trattate.



Composizione

Quizalofop-p-etile (50 g/l) 5,4%

Formulazione

Concentrato emulsionabile

Confezioni

1 L (collo da n° 12 pz.)

5 L (collo da n° 4 pz.)

Registrazione

n° 13299 del 16.10.2006



Magiò®:

marchio registrato Gowan Italia.