

Quasar MZ WG

- ▶ FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO CHE ASSOCIA DIMETOMORF (AZIONE TRANSLAMINARE) E MANCOZEB (COPERTURA)
- ▶ ELEVATA EFFICACIA GRAZIE ALL'ABBINAMENTO DI DUE DIFFERENTI MECCANISMI D'AZIONE



COMPOSIZIONE

dimetomorf 9%
mancozeb 60%

CODICE FRAC

40
M03

FORMULAZIONE

granuli idrodispersibili (WG)

BUFFER ZONE

Consultare il riferimento
della sezione dedicata
(pag. 167)

INDICAZIONI DI PERICOLO

CLP: H317; H361d; H410; EUH401



Attenzione

REG. MIN. SALUTE

n° 14805 del 20.01.2010

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	MAX
Vite	Peronospora	200-220 g/hl (2-2,2 kg/ha)	Trattare ogni 8-12 gg a partire dalla terza foglia distesa in funzione del rischio di malattia e fino a invaiatura completa.	28 gg	4
Pomodoro	Peronospora	2-2,2 kg/ha	Trattare ogni 7-10 gg dalla prima foglia ben visibile alla piena maturazione nel periodo di più alto rischio di infezione.	3 gg	3

Prodotto originale BASF



AVVERTENZE
Non impiegare in serra.