Primial® WG

INSETTICIDA BIOLOGICO PER IL CONTROLLO DELLE LARVE DEI LEPIDOTTERI

PRIMIAL WG è una formulazione in granuli idrodisperdibili di *Bacillus thuringiensis* varietà kurstaki; attivo per ingestione contro le larve di numerose specie di lepidotteri, è registrato su un ampio numero di colture e ha un brevissimo intervallo di sicurezza
Il suo impiego è consentito in Agricoltura Biologica.

INSETTICIDA



COMPOSIZIONE
Bacillus thuringiensis subsp. *kurstaki*
ceppo ABTS 351
prodotti di fermentazione solidi e solubili g. 54
(Potenza 32.000 UI/mg formulato su Trichoplusia ni)

FORMULAZIONE
granuli idrodispersibili

NUMERO DI REGISTRAZIONE
9655 del 3.6.98

INDICAZIONI DI PERICOLO
–

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi (g/hl)	Dosi (g/ha)	Volumi d'acqua (l/ha)	N. trattamenti/anno (intervallo tra le applicazioni)	Intervallo di sicurezza
Agrumi	Tignola degli agrumi *(Prays citri)*	60 - 80	600 - 800	1000	1 - 3 (7 giorni)	–
Pomacee	Lepidotteri defogliatori, Tortricidi ricamatori	100	500 - 1500	500 - 1500	3 - 8 (6 giorni)	
Vite	Lepidotteri defogliatori, Tignoletta della vite *(Lobesia botrana)*	50 - 100	500 - 1000	1000 - 2000	1 - 8 *1 - 4 per generazione* (7 giorni)	
Olivo	Tignola dell'olivo *(Prays oleae)*, Ifantria *(Hyphantria cunea)*	60 - 80	600 - 800	1000	1 - 3 (7 giorni)	
Drupacee	Lepidotteri defogliatori, Tignola orientale *(Cydia molesta)* Anarsia *(Anarsia lineatella)*	60 - 100	750 - 1500	1000 - 1500	3 - 10 *2 - 5 per generazione* (3 - 16 giorni)	
Actinidia	Eulia *(Argyrotaenia pulchellana)*, Tignola	60 - 100	600 - 1000	1000	*1 - 2 per generazione* (7 giorni)	
Fragola	Piralide *(Ostrinia nubilalis)*, Tortrice verde-gialla delle pomacee *(Pandemis cerasana)*, Eulia *(Argyrotaenia pulchellana)*	90 - 100	550 - 600	600	*1 - 3 per generazione* (5 - 7 giorni)	
Patata	Tignola della patata *(Phthorimaea operculella)*, Ifantria *(Hyphantria cunea)*	100 - 165	600 - 1000	600	*1 - 3 per generazione* (3 - 16 giorni)	
Mais	Piralide del mais *(Ostrinia nubilalis)* Ifantria *(Hyphantria cunea)*	100 - 165	600 - 1000	600	1 - 6 *1 - 3 per generazione* (5 - 7 giorni)	

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Effettuare il trattamento alla comparsa delle prime larve quando è maggiore l'attività trofica ripetendo il trattamento ad intervalli come indicato nella tabella fino al termine della schiusura delle uova. Mantenere l'intervallo di applicazione più breve con forte crescita vegetativa e sviluppo della pianta al fine di assicurare una completa copertura della nuova vegetazione.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE:

Conservare le confezioni in luogo fresco, asciutto e ventilato. A temperatura ambiente (21-24°C) il prodotto è stabile per almeno 3 anni. Chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata. Durante il trasporto è bene mantenere gli imballaggi in luogo ombreggiato. Non esporli al sole sul piazzale di carico.

Registrazione Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi (g/hl)	Dosi (g/ha)	Volumi d'acqua (l/ha)	N. trattamenti/anno (intervallo tra le applicazioni)	Intervallo di sicurezza
Orticole in pieno campo: Brassicacee *(Cavoli broccoli, Cavoli cappucci, Cavolfiori, Cavoli cinesi, Cavoli ricci, Cavoletti di Bruxelles, Cavolo verde portoghese, Cavoli rapa)*, Ravanello, Colza, Ravizzone, Solanacee *(Pomodoro, Peperone, Melanzana)*, Cucurbitacee *(Melone)*, Lattughe e insalate, Carciofo, Porro	Nottuidi *(Spodoptera* spp., *Helicoverpa* spp., *Agrotis segetum, Mamestra brassicae, Autographa gamma, Trichoplusia ni, Plusia* spp.*)*, Depressaria *(Depressaria erinaceella)*, Evergestis forficalis, Cavolaia *(Pieris brassicae, Pieris rapae)*, Tignola delle Crucifere *(Plutella xylostella)*, Vanessa del cardo *(Vanessa cardui)*, Tignola del pomodoro *(Tuta absoluta)*	100 - 200	750 - 1000	500 - 1000	1 - 8 *1 - 3 per generazione* (7 giorni)	—
Erbe Fresche, Fagiolino, Cardo, Sedano, Finocchio	Nottue, Udea *(Udea rubigalis)*, Vanessa del cardo *(Cynthia cardui)*	75 - 85	450 - 500	600	1 - 8 *1 - 3 per generazione* (7 giorni)	
	Falene defoglatrici, Tortricidi *(Tortrix* spp.*)*, Ifantria *(Hyphantria cunea)*	100 - 165	600 - 1000			
Cucurbitacee *(Zucca, Zucchino, Cocomero)*	Nottue, Piralide *(Ostrinia nubilalis)*	90 - 100	550 - 600	600	1 - 8 *1 - 3 per generazione* (7 giorni)	
	Falene defoglatrici, Tortricidi *(Tortrix* spp.*)*, Ifantria *(Hyphantria cunea)*	100 - 165	600 - 1000			
Orticole in serra: Fagiolo, Peperone, Cetriolo, Melanzana, Pomodoro	Lepidotteri defogliatori, Tignola del pomodoro *(Tuta absoluta)*, Nottuidi *(Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites, Mamestra oleracea, Ostrinia furnacalis)*	100 - 200	500 - 1000	500 - 1000	1 - 8 *1 - 3 per generazione* (7 giorni)	
Barbabietola da zucchero, Bieta rossa	Ifantria *(Hyphantria cunea)*, Mamestra *(Mamestra brassicae)*, Tignola *(Scrobipalpa ocellatella)*	100 - 165	600 - 1000	600	*1 - 3 per generazione* (3 - 7 giorni)	
Soia	Vanessa *(Cynthia cardui)*, Ifantria *(Hyphantria cunea)*	100 - 165	600 - 1000	600	*1 - 3 per generazione* (3 - 7 giorni)	
Girasole, Cotone	Nottuidi, Ifantria *(Hyphantria cunea)*	100 - 165	600 - 1000	600	*1 - 3 per generazione* (3 - 7 giorni)	
Riso	Lepidotteri defogliatori, Nottua delle Graminacee *(Mythimna unipuncta)*, *Spodoptera* spp.	200	750 - 1000	375 - 500	1 - 2 (10 giorni)	
Colture floreali ed ornamentali in serra	Lepidotteri defogliatori, Nottua gialla del pomodoro *(Helicoverpa armigera)*, Nottua piccola *(Spodoptera exigua)*, Plusia del pomodoro *(Chrysodeixis chalcites)*	100 - 200	750 - 1000	500 - 1000	1 - 8 *1 - 3 per generazione* (7 giorni)	
Tappeti erbosi e vivai	Lepidotteri defogliatori, Ifantria *(Hyphantria cunea)*	100 - 165	600 - 1000	600	*1 - 3 per generazione* (7 giorni)	

CONFEZIONI

sacchetti da **1 kg**
in cartoni da 10 pezzi



Biocontrols

CONSENTITO IN Agricoltura Biologica

INSETTICIDI

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.