Curzate® M WHITE

Antiperonosporico per vite e alcune colture orticole (pomodoro, patata, cetriolo, zucchino)

Colture	Principali avversità controllate	Dosi	N° max tratt. annui	Int. di sicurezza
Vite	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	300 g/hl disciolto in 500-1250 litri di acqua per un dosaggio massimo pari a 3,75 kg/ha	4	28 giorni
Pomodoro (in pieno campo)	Peronospora *(Phytophthora infestans)* e alternaria *(Alternaria solani)*	3 kg/ha disciolto in 300-1000 litri di acqua	5	3 giorni
Patata (in pieno campo)	Peronospora *(Phytophthora infestans)* e alternaria *(Alternaria solani)*	3 kg/ha disciolto in 300-1000 litri di acqua	4	20 giorni
Cetriolo, zucchino (in pieno campo)	Peronospora delle cucurbitacee *(Pseudoperonospora cubensis)*	3 kg/ha disciolto in 500-1000 litri di acqua	4	3 giorni

CARATTERISTICHE:


Fungicida efficace contro la peronospora della vite ed alcune colture orticole in pieno campo.
E' caratterizzato da attività translaminare e di contatto, ed agisce sia sul micelio nei primissimi stadi di sviluppo che sulle zoospore germinanti. Inserire il prodotto in un programma di lotta su vite in pre-fioritura, con intervallo di applicazione di 7 giorni.

VANTAGGI:

- Comprovata efficacia sulla peronospora
- Azione retroattiva/curativa e antisporulante di cymoxanil
- Attività di copertura di mancozeb nelle prime fasi di sviluppo della coltura
- Miscibile con i più noti agrofarmaci
- Non imbratta







Registrazione: N° 14565 del 02/04/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

COMPOSIZIONE:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Esametilentetrammina
Coformulanti q. b. a 100

FORMULAZIONE:
Polvere bagnabile

CONFEZIONE:
Sacchetto da 1 kg (x 10)

CONTENUTO PALETTA:
28 x 10 x 1

CLASSIFICAZIONE:



ATTENZIONE

GRUPPO FRAC	27, M3	FUNGICIDI