FASTAC®

INSETTICIDA AD AZIONE RAPIDA

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
4,75 g
di ***Alfacipermetrina***
(pari a 42,75 g/l)
(Alfacipermetrina ed Alfametrina sono sinonimi e, come tali, indicano la medesima sostanza attiva)

FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile (EC)

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO

REG. MIN. SALUTE

N° 6298
del 13-03-1985

CONFEZIONE

1 Lt flacone

IMBALLO

Cartone
- da 10 flaconi

Caratteristiche

FASTAC® è un insetticida piretroide efficace contro **Coleotteri, Emitteri** e **Lepidotteri** parassiti di colture **Floreali, Frutticole**, **Orticole** in pieno campo e **Pioppo**. Oltre alla rapida azione per contatto ed ingestione, FASTAC® offre un effetto prolungato e possiede anche un certo effetto repellente verso gli insetti nocivi.

Modalità d'uso

È molto importante bagnare bene la vegetazione della coltura da trattare. Come regola generale, si consiglia di applicare FASTAC® all'inizio delle infestazioni per sfruttarne anche l'azione repellente. Nei trattamenti primaverili-estivi contro l'**Afide verde del Pesco** e nei trattamenti contro gli **Afidi del Pomodoro**, non utilizzare il prodotto quando le foglie sono già accartocciate. Contro le **Cocciniglie degli Agrumi** è possibile miscelare FASTAC® con olio bianco. Contro gli **Aleurodidi del Pomodoro** intervenire ogni 7-10 giorni.

Avvertenze

FASTAC® non provoca fenomeni di fitotossicità sulle colture **Floricole**. Tuttavia, nel caso di varietà nuove o notoriamente delicate, è opportuno eseguire saggi preliminari, specialmente su **Rose** e **Poinsettie**. FASTAC® è compatibile con gli insetticidi ed i fungicidi maggiormente utilizzati in agricoltura, ma non va miscelato con prodotti fortemente alcalini.

COLTURA	PARASSITI	DOSE (ml/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
AGRUMI	Afidi: brunastro, verde chiaro, verde scuro	50	-	30
	Ceroplaste, Cocciniglia mezzo grano di pepe, Cocciniglia rossa degli Agrumi	30	-	30
	Tignola degli Agrumi	80-100	-	30
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Afide nero, Afide verde, Altica, Cassida, Cleono, Lisso	0,7-1 (l/ha)	-	24
CARCIOFO	Mosca minatrice Nottue	100 70-100	- -	7 7
CAVOLFIORE CAVOLO CAPPUCCIO	Cavolaia	50	-	7
FAGIOLO, LATTUGA	Afide nero, Afide verde	70-100	-	3
FLOREALI	Afidi, Aleurodide, Bega sud africana Tripidi	70 200 70-100 100	- - - -	- - - -
FRUMENTO, ORZO	Afidi	0,4-0,6 (l/ha)	-	42
MELO	Afidi, Afide grigio Carpocapsa Cemiostoma, Litocollete Ricamatori	100 50-100 100 50	- - - -	7 7 7 7
PERO	Afidi	100	-	7
	Psilla	100 150-200	Nel trattamento di fine inverno In primavera-estate	7
PESCO	Afide verde	30 50	A bottoni rosa In primavera-estate	7
	Mosca della frutta	40	-	7
	Tignola, Tignola orientale	30-40	-	7
	Tortrici ricamatori	40-60	-	7
	Tripidi	70 50	A bottoni rosa In post-fioritura	7 7

Avvertenze: Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

ECOPACKAGING BY BASF© PENSATO PER TE

INSETTICIDI

COLTURA	PARASSITI	DOSE (ml/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
PIOPPO	Criptorrinco Saperda	100 200	- -	- -
POMODORO	Afide nero, Afide verde	50-100	-	7
	Aleurodide	200 50-100	- Per trattamenti ogni 7-10 gg	3
	Liriomiza	100	-	3
	Nottue	70-100	-	3
TABACCO	Afidi	70	-	60
VITE	Cicalina Tignole	30-50 30	- -	7 7

INSETTICIDI

