

Mediator[®] Plus

MEDIATOR[®] PLUS è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.

Insetticidi

Composizione:

Imidacloprid puro g 17,8 (200 g/L)

Formulazione:

Sospensione concentrata (SC)

N° di registrazione:

16188 del 15.12.2014

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

EUH208 - H410 - EUH401

Confezione:

L 1

Intervallo di sicurezza:

3 gg per fagiolo, fagiolino, cetriolo e zucchino; 7 gg per pomodoro, melanzana, peperone, cocomero, melone; 30 gg per fragola prima del raccolto.



Colture	Avversità	Dose	Note
Pomodoro, Melanzana (in serra)	Afidi (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aulacorthum solani</i>)	50 mL/hL (0,5 - 0,75 L/ha) 0,75 - 1 L/ha	Applicazioni fogliari. Trattamento per irrigazione.
	Aleurodidi (es. <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) e dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	75 mL/hL (0,5 - 0,75 L/ha) 0,75 - 1 L/ha	Applicazioni fogliari. Trattamento per irrigazione.
Zucchino, Cetriolo, (in Serra)	Afidi (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aulacorthum solani</i>)	50 mL/hL (0,5 - 0,75 L/ha) 0,75 - 1 L/ha	Applicazioni fogliari. Trattamento per irrigazione.
	Aleurodidi (es. <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	75 mL/hL (0,5 - 0,75 L/ha) 0,75 - 1 L/ha	Applicazioni fogliari. Trattamento per irrigazione.
Floreali ed Ornamentali (in serra)	Afidi (es. <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphoniella chrysanthami</i> , <i>Macrosiphum rasae</i>) e Metcalfa pruinosa	50 mL/hL	
	Aleurodidi (es. <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	75 mL/hL	

Avvertenze

Effettuare al massimo un trattamento l'anno su tutte le colture in etichetta.