Prova di post emergenza - Caleppio di Settala (MI)

Risultato 15 giorni dal trattamento



Testimone
Amaranthus spp,
Solanum spp., Cyperus spp.



Trattato
TEMSA 100 1 L/ha
+ ONYX 1 L/ha

I punti di forza di ONYX

- Gestione delle resistenze
- Selettivo per la coltura
- Ampio spettro d'azione
- Profilo Ecotox favorevole

Onyx è il partner ideale di Temsa 100 e dalla loro sinergia nasce il Booster effect:


- Amplia lo spettro d'azione
- Migliora l'efficacia
- Aumenta la velocità d'azione

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.


Posizionamento

Dose d'impiego:	
- Trattamento unico	**1,5 L/ha**
- Trattamento frazionato	**due applicazioni a 0,75 L/ha**
Colture autorizzate :	**Mais**
	Mais dolce
Epoca applicazione:	**Post emergenza** BBCH 12-18

Post precoce



Post classica



Belchim Crop Protection Italia Spa
Centro Direzionale Milanofiori - Strada 6 Palazzo N 3 | 20089 Rozzano (MI)
T. 02 33599422 - 02 33576501 | F. 02 87152284
Email: belchim.italia@belchim.com | www.belchim.it

Per maggiori informazioni inquadra il QrCode e scarica la nostra APP

ONYX®

Booster Effect
per un risultato di successo



BELCHIM CROP PROTECTION

Profilo Prodotto ONYX

Composizione: Piridate 600 g/L
Famiglia Chimica: Fenil-piridazine
Meccanismo d'azione: HRAC C3
Formulazione: Concentrato Emulsionabile (EC)
Classificazione: ATTENZIONE

Reg. Ministero della Salute: N. 15806 del 21/02/2018
Colture Autorizzate: Mais e Mais Dolce




Meccanismo d'azione

Il Piridate è un erbicida di contatto.

Assorbito per via fogliare attraversa rapidamente la cuticola fogliare interferendo con il processo fotosintetico.

Piridate provoca l'arresto immediato della crescita dell'infestante. Sulla pianta sono inizialmente visibili imbrunimenti del lembo fogliare. Segue il disseccamento dei tessuti con la successiva morte della pianta.

Confezione



Alcune delle infestanti controllate


Amaranthus retroflexus


Senecio vulgaris



Chenopodium album



Solanum nigrum


Mercurialis annua


Thlaspi arvense

Efficacia dopo 6 giorni dal trattamento





Profilo Ecotossicologico favorevole

- Non tossico per i mammiferi e gli organismi del terreno
- Non cancerogeno, teratogeno o mutageno
- Non residua nel terreno
- Non soggetto alla percolazione e al dilavamento

Comportamento del Piridate nel Suolo

Proprietà ambientale, ecotossicologica, tossicologica	Indicatore	Valore	Legenda
Persistenza nel suolo	DT50	2,2 gg	DT50: Tempo di degradazione del 50% del principio attivo
Persistenza nel suolo	DT90	5,4 gg	DT90: Tempo di degradazione del 90% del principio attivo
Mobilità nel suolo	Koc	223800 mg/g Non mobile	Koc: Costante di ripartizione tra il carbonio organico contenuto nel suolo e nell'acqua

Strumento efficace per la Gestione delle Resistenze

Piridate, con un meccanismo d'azione diverso da quello dei più comuni erbicidi utilizzati nel post emergenza (es. sulfoniluree e trichetoni), contribusce attivamente alla gestione delle infestanti nell'ambito di una strategia anti-resistenza.