

CITROLE®

CONCENTRATO EMULSIONABILE A BASE DI OLIO DI PARAFFINA PER TRATTAMENTI INSETTICIDI E ACARICIDI SU COLTURE ARBOREE



COMPOSIZIONE

Olio di paraffina
CAS-64742-46-7 puro
(U.R. 99 %)
96,9 % (= 790 g/l)

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ	PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N° 8534 del 30-07-1994	EC Emulsione concentrata	Citrole non è miscibile con prodotti a base di zolfo, polisolfuri, carbammati, captano, clorotalonil, dimetoato, folpet. Qualora fossero effettuati trattamenti con tali formulati l'applicazione di Citrole deve essere effettuata almeno 15 giorni prima o due settimane dopo quella dei prodotti citati, ad eccezione dei ditioicarbammati, per i quali può essere applicato 3-5 giorni prima o dopo.	480 640	1 L 20 L	 PERICOLO H304, EUH401
BUFFER ZONE	GRUPPO IRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	
15 m da corpi idrici superficiali per l'applicazione in inverno su pomacee e drupacee - 10 m da zona non coltivata per pomacee e drupacee - 5 m da zona non coltivata per la vite.	NC	—	—	Total Fluides S.A.S	Total Fluides S.A.S

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Drupacee	Cocciniglie, Afidi, Acari	2 l/hl in 10-15 hl/ha d'acqua	In primavera-estate (BBCH 69-85). Consigliate 2 applicazioni, con intervallo di 60 giorni.	1 gg	2
		2,5 l/hl in 10-15 hl/ha d'acqua	In inverno (BBCH 00-11). Consigliate 2 applicazioni, con intervallo di 60 giorni.	1 gg	2
Pomacee	Cocciniglie, Afidi, Acari, Psilla	2 l/hl in 10-15 hl/ha d'acqua	In primavera-estate (BBCH 69-85). Consigliate 2 applicazioni, con intervallo di 60 giorni.	1 gg	2
		2,5 l/hl in 10-15 hl/ha d'acqua	In inverno (BBCH 00-11). Consigliate 2 applicazioni, con intervallo di 60 giorni.	1 gg	2
Agrumi	Cocciniglie, Afidi, Acari	2 l/hl in 10-20 hl/ha d'acqua	In primavera-estate (BBCH 69-85). Consigliate 2 applicazioni, con intervallo di 60 giorni.	1 gg	2
		1,5 l/hl in 10-15 hl/ha d'acqua	In inverno (BBCH 00-69). Consigliate 2 applicazioni, con intervallo di 60 giorni.	1 gg	2
Vite (uva da vino e da tavola)	Cocciniglie, Afidi, Acari	2,5 l/hl in 6 hl/ha d'acqua	In inverno (BBCH 00-11). Consigliate 2 applicazioni, con intervallo di 60 giorni.	1 gg	2

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - Efficace per la lotta contro le cocciniglie e le uova di acari, esplica anche un'attività ovicida ed antischiusura nonché un'azione repellente verso alcuni insetti masticatori. Si consigliano gli interventi su Pero cv. Decana. Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C e su piante stressate.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 m da corpi idrici superficiali per l'applicazione in inverno su pomacee e drupacee. Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m da zona non coltivata per pomacee e drupacee e di 5 m per la vite. Pericoloso per le api. Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non applicare sulle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura. Tempi di rientro: attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nell'area trattata.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni