

MANAGER®

ERBICIDA SELETTIVO EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI GRAMINACEE

COMPOSIZIONE

Quizalofop-p-etile puro
5,4 % (=50 g/l)

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ	PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N° 11789 del 09-06-2003	EC Emulsione concentrata	Il prodotto si usa da solo	396 600	1 L 5 L	<p>PERICOLO</p> <p>H304, H315, H319, H336, H410, EUH401</p>
BUFFER ZONE	GRUPPO HRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	
10-15 m con dose 3 l/ha 5-10 m con dose 2 -2,5 l/ha 5 m con dose 1-1,5 l/ha	A	3082	9	Sumitomo Chemical Italia	ADAMA AGAN Ltd.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Cavoli a testa, Cavolfiore, Broccolo	Graminacee annuali: <i>Alopecurus</i> spp. (Coda di topo), <i>Avena</i> spp. (<i>Avena</i>), <i>Digitaria</i> spp. (Sanguinella), <i>Echinochloa</i> spp. (Giovane), <i>Lolium</i> spp. (Loietto), <i>Phalaris</i> spp. (Scagliola), <i>Poa annua</i> (Fienarola), <i>Setaria</i> spp. (Pabbio). Graminacee poliennali: <i>Agropyron repens</i> (Agropiro comune), <i>Cynodon dactylon</i> (gramigna comune), <i>Sorghum halepense</i> (Sorghetta da seme).	1-3 l/ha in 200-400 litri di acqua	Da superamento della crisi di trapianto fino a tempo di carenza.	30 gg	1
Pomodoro, Melanzana			Da superamento della crisi di trapianto fino ad allegazione.	30 gg	
Colza			Entro la chiusura della fila.	100 gg	
Tabacco			Fino al termine dell'allungamento degli internodi.	40 gg	
Patata			Entro la chiusura della fila.	30 gg	
Erba medica, Trifoglio, Veccia			Entro la chiusura della fila.	—	
Vite da vino e vite da tavola, Melo, Pero, Cotogne, Nespole, Nespole del Giappone, Pesco, Nettarino		1-2,5 l/ha in 200-400 litri di acqua	Prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica.	30 gg 45 gg vite	
Agrumi, Albicocco, Susino, Ciliegio, Frutta a guscio			Trattare in assenza di frutti.	—	
Ornamentali, Vivai, Forestali			Trattamenti di post-emergenza delle malerbe ammesse solo mediante l'impiego di attrezzature schermate.	—	
Lino, Cotone			Trattamenti di post-emergenza e prima che le parti eduli della coltura si siano formate.	60 gg cotone	
Soia, girasole			Trattare entro la chiusura della fila.	60 gg	
Barbabietola da zucchero, Barbabietola rossa e da foraggio			Entro la chiusura della fila.	60 gg	
Cipolla, aglio, scalogno			Fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del bulbo.	30 gg	
Carota, Rapa, Ravanello			Fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del fittone.	30 gg	
Cece, Lentischia, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Pisello			Fino al termine dell'allungamento degli internodi o entro la chiusura della fila.	42 gg 30 gg lenticchia e consumo secco di fagiolo, pisello, favino e cece	
Cardo (uso non alimentare)	1-2 l/ha in 200-400 litri di acqua	Entro la chiusura della fila.	—		

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - Impiegare il prodotto alla dose più bassa per il controllo delle infestanti nei primi stadi di sviluppo e alle dosi più elevate per il controllo delle infestanti entro lo stadio di pieno accostamento. In relazione all'andamento stagionale, l'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni. Per evitare il diffondersi di fenomeni di resistenza, il prodotto va impiegato esclusivamente per il controllo di infestanti in attiva crescita, nei primi stadi di sviluppo e non sottoposte a stress (siccità, ristagno idrico o condizioni atmosferiche). Dopo un trattamento con Manager è possibile seminare o trapiantare senza limitazioni tutte le colture in normale successione agronomica ed in rotazione. In caso di necessità di sostituzione delle colture trattate con Manager, effettuare un'aratura profonda prima di seminare o trapiantare la nuova coltura; si sconsiglia la semina di cereali.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto dalla vegetazione naturale di: Dose 3 l/ha: 15 m con ugelli tradizionali; 10 m con ugelli di fine barra** - Dose 2 -2,5 l/ha: 10 m con ugelli tradizionali; 5 m con ugelli di fine barra** - Dose 1-1,5 l/ha: 5 m con ugelli tradizionali; 5 m con ugelli di fine barra** (**Riduzione fascia di rispetto consentita solo per volumi di applicazione ≤ 300 l/ha e altezza della barra ≤ 1 m.). Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro, guanti protettivi e un'adeguata protezione per il viso. Durante la fase di applicazione utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti protettivi. Non entrare nell'area trattata prima che la coltura sia perfettamente asciutta. In caso di raccolta manuale da colture basse, è necessario indossare i guanti.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).