MODELLO DELLA TRAPPOLA	CONFEZIONE	INDICAZIONI DI IMPIEGO
IIB 	**x 3** 9 trappole 9 erogatori di attrattivi	La durata indicativa del monitoraggio per trappola è di 8 settimane; sostituire l'erogatore di feromone ogni 4-6 settimane. Installare 2-3 trappole per ettaro ad altezza uomo. Per appezzamenti di superfici inferiori all'ettaro è opportuno collocare almeno 2 trappole. Intervenire in caso di superamento della soglia. **Sipcam Italia consiglia: EPIK SL (Pag. 77), SPARVIERO (Pag. 90), TREBON UP (Pag. 92)**
IC	**x 3** 3 trappole 9 fondi 9 erogatori	La durata indicativa del monitoraggio per trappola è di 12 settimane; sostituire il fondo e il feromone ogni 4 settimane. Installare 2-3 trappole per ettaro ad altezza uomo. Per appezzamenti di superfici inferiori all'ettaro è opportuno collocare almeno 2 trappole. Intervenire in caso di superamento della soglia. **Sipcam Italia consiglia: SPARVIERO (Pag. 90)**
IC	**x 1** 1 trappola 3 fondi 3 erogatori **x 3** 3 trappole 9 fondi 9 erogatori **RICAMBIO x 18** 18 erogatori 18 fondi	La durata indicativa del monitoraggio per trappola è di 12 settimane; sostituire il fondo e il feromone ogni 4 settimane. Installare 2-3 trappole per ettaro ad altezza uomo. Per appezzamenti di superfici inferiori all'ettaro è opportuno collocare almeno 2 trappole. Intervenire in caso di superamento della soglia. **Sipcam Italia consiglia: TREBON UP (Pag. 92), SPARVIERO (Pag. 90)**

MOSCA MEDITERRANEA DELLA FRUTTA
(Ceratitis capitata)

VERME DELLE SUSINE
(Cydia funebrana)

TIGNOLA DEL PESCO
(Anarsia lineatella)