Altair 20 EW

› FUNGICIDA ANTIOIDICO SISTEMICO AUTORIZZATO SU NUMEROSE COLTURE
› AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

COMPOSIZIONE
miclobutanil 20% (200 g/l)

FORMULAZIONE
emulsione acquosa (EW)

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H319; H361d; H373; H411; EUH066; EUH401



Attenzione

REG. MIN. SALUTE
n° 15895 del 08.01.2014

CODICE FRAC
3

BUFFER ZONE
Consultare l'etichetta

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	MAX
Vite (da vino e da tavola)	Oidio, Black rot	28 ml/hl (280 ml/ha)	Iniziare i trattamenti a bottoni fiorali separati proseguendo ad intervalli di 8-14 gg fino a fine invaiatura.	14 gg	3*
Melo, Melo cotogno, Nespolo, Nashi	Oidio, Ticchiolatura	28 ml/hl (280 ml/ha)	Iniziare i trattamenti a mazzetti affioranti e proseguendo ogni 10-14 gg	14 gg	3*
Pesco, Nettarine, Susino, Albicocco	Oidio, Monilia	30 ml/hl (300 ml/ha)	Iniziare dallo stadio di prime foglie distese ripetendo il trattamento a distanza di 10 gg. Per il controllo della monilia del fiore effettuare 2 trattamenti a bottoni fiorali e a caduta petali.	7 gg	2*
Melone, Cocomero (in pieno campo), Zucchino, Cetriolo, Cetriolino, Zucca (in coltura protetta), Pomodoro, Melanzana (in campo e coltura protetta)	Oidio	37,5 ml/hl (375 ml/ha)	Iniziare preventivamente oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi e proseguire a intervalli di 8-12 gg	3 gg	3*
Carciofo	Oidio	28 ml/hl (280 ml/ha)	Iniziare preventivamente oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi e proseguire a intervalli di 8-12 gg	7 gg	2*
Fragola (in campo e coltura protetta)	Oidio	30 ml/hl (300 ml/ha)	Iniziare preventivamente oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi e proseguire a intervalli di 7-12 gg	3 gg	3*
Rosa, Crisantemo, Garofano (in campo e coltura protetta), Alberi e arbusti ornamentali (a dimora e in vivaio)	Oidio, Ticchiolatura, Ruggine	37,5 ml/hl (375 ml/ha)	Intervenire ai primi sintomi con intervalli di 10 gg	n.r.	3*

*Non effettuare più di due trattamenti consecutivi col prodotto o con altri aventi la medesima modalità d'azione

Prodotto originale Corteva Agriscience

FLACONE
0,5 litri (cartone 20 pz)



AVVERTENZE
Su vite da tavola, bagnare accuratamente il grappolo. In caso di miscela con formulati contenenti fosetil alluminio si consiglia di pre-miscelare in acqua (1:10), versare la pre-mix in botte, mantenere l'agitatore in movimento ed aggiungere i formulati contenenti fosetil alluminio.

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Prestare attenzione alle indicazioni di pericolo.