



MEDIATOR® TOP

INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO
IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

- Elevata attività transaminale.
- Possiede un forte effetto abbattente nei confronti delle forme adulte dei parassiti delle colture, orticole.
- Agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.



Applicazione
sulla pianta



COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

IMIDACLOPRID PURO g 17,1 (= 200 g/l)



REGISTRAZIONE

n. 14797 del 8.02.2010



CLASSIFICAZIONE

CLP



H410



FORMULAZIONE

Sospensione concentrata



CONFEZIONI

1 litro (Cartone: 12x1)



CARENZA

3 giorni: cetriolo, zucchini, melanzana, pomodoro e peperone
7 giorni: anguria e melone.



MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Effettuare max 1 trattamento l'anno.



COLTURE



PATOGENI



DOSE



NOTE

POMODORO, MELANZANA,
PEPERONE
(in serra)

Afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani); e aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

50-75 ml/hl
(dose massima 0,75 l/ha).

Su queste colture, in serra, è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 l/ha di prodotto.
Le colture trattate in serra non possono essere poste all'esterno fino alla conclusione del raccolto.

ZUCCHINO, CETRIOLO,
MELONE, ANGIURIA
(in serra)

Afidi (Aphis gossypii, Myzus persicae) e aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

50-75 ml/hl
(dose massima 0,75 l/ha).

Su queste colture, in serra, è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 l/ha di prodotto.
Le colture trattate in serra non possono essere poste all'esterno fino alla conclusione del raccolto.

FLOREALI E ORNAMENTALI
(in serra)

Afidi (es. Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemii, Macrosiphum rosae) e aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

50-75 ml/hl
(dose massima 0,75 l/ha).

Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione in serra. Operare mettendo in sospensione 0,5-0,7 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.
Le piante trattate in serra non possono essere poste all'esterno fino a conclusione della fioritura.