



INQUADRA IL LOGO  
CON LA NOSTRA APP



11



Avvertenza: **ATTENZIONE**  
Indicazioni di pericolo:  
H319 - H361d -  
H410 - EUH401

Prodotto e marchio  
di titolarità del  
Gruppo Syngenta.  
Distribuito da  
Adama Italia S.r.l.

**FORMULAZIONE:**  
Sospensione concentrata

**COMPOSIZIONE:**  
Isopyrazam 11,2% (125 g/l)  
Protioconazolo 13,5% (150 g/l)

**FRAC:**  
7 (C2)  
3 (G1)

**N. REGISTRAZIONE:**  
16635 del 11-07-2017

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento tenero e duro	Oidio, Septoriosi, Stagonosporiosi, Ruggine bruna, Ruggine gialla	1 l/ha	Massimo 2 applicazioni ad intervallo minimo di 14 giorni dallo stadio di inizio levata fino allo stadio di fine fioritura	-
	Fusariosi della spiga		Una applicazione tra inizio e fine fioritura	
Orzo	Oidio, Maculatura reticolare, Rincosporiosi, Ramularia dell'orzo, Ruggine bruna		Massimo 2 applicazioni ad intervallo minimo di 14 giorni dallo stadio di inizio levata fino allo stadio di fine spigatura	

#### MISURE DI MITIGAZIONE

Per proteggere gli organismi acquatici ridurre la deriva con una zona di sicurezza non trattata di 10 metri e utilizzare misure di mitigazione del ruscellamento per una riduzione dell'80% oppure rispettare una fascia vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali.