

UNA NUOVA SOLUZIONE
PER IL DISERBO DEL POMODORO,
DELLE LEGUMINOSE E ALTRE COLTURE

Bonalan[®] 600 WG



ERBICIDA

antigerminello di pre-semina e pre-trapianto
selettivo per alcune colture

Gowan[®]
ITALIA
l'affidabilità in agricoltura

Bonalan® 600 WG

UNA SCELTA VINCENTE

- ✓ **Salvaguarda la coltura**
- ✓ **Esalta le capacità produttive**
- ✓ **Si impiega con praticità**



Bonalan® 600 WG

Composizione: Benfluralin 60%

Famiglia chimica:
Dinitroaniline



Meccanismo d'azione:

Inibizione dell'assemblaggio dei microtubuli fibrosi durante il processo di mitosi cellulare (HRAC: gruppo K1, WSSA: gruppo 3)

Effetto sulle infestanti:

Inibizione della germinazione dei semi (azione antigerminello)

Formulazione: Granuli idrodispersibili

Confezioni: 5 kg

Registrazione: n. 15564 del 12.01.2015



Bonalan® 600 WG:
prodotto originale e marchio registrato Gowan.

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

BONALAN 600 WG è l'erbicida antigerminello a base di benfluralin, sostanza attiva di proprietà Gowan, nuova soluzione per il diserbo del Pomodoro e di altre colture, efficace contro le principali infestanti graminacee e dicotiledoni.

SELETTIVITÀ CULTURALE

Bonalan 600 WG non manifesta sintomi di fitotossicità e salvaguarda le potenzialità produttive.

EFFICACIA ERBICIDA

Bonalan 600 WG è efficace nei confronti di molte graminacee annuali e delle dicotiledoni più diffuse nel nostro ambiente.

PERSISTENZA D'AZIONE

Bonalan 600 WG resiste al dilavamento anche nelle annate più piovose e manifesta un prolungato effetto erbicida a seconda delle condizioni pedo-climatiche.

PRATICITÀ D'IMPIEGO

Bonalan 600 WG, grazie alla sua persistenza, può essere impiegato in concomitanza dell'ultima fase di preparazione del terreno.

PARTNER IDEALE

Bonalan 600 WG è la soluzione ottimale per completare lo spettro d'azione erbicida su importanti infestanti del Pomodoro e di altre colture.



Testimone non trattato



Treatato con Bonalan e metribuzin + pendimetalin

IMPIEGO DI BONALAN 600 WG

Epoca d'impiego (una sola volta per anno e per coltura)

Pre-semina o pre-trapianto

Campi d'impiego (in pieno campo)

- **Girasole, Pomodoro:** 2,1-2,5 kg/ha
- **Erba medica:** 1,8-2,1 kg/ha
- **Pisello, Pisello coltivato, Pisello verde, Pisello Mangiatutto/Pisello Dolce/Taccole, Cece, Fagiolo, Fagiolino, Fagiolo di Spagna, Fagiolo nano, Fagiolo asparago, Jack Bean, Fagiolo di Lima, Fagiolo dall'occhio:** 1,8 kg/ha

Infestanti controllate

INFESTANTI SENSIBILI: Amarantho (*Amaranthus* sp.), Farinaccio comune (*Chenopodium album*), Digitaria (*Digitaria* sp.), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Loietto (*Lolium* sp.), Loiessa (*Lolium multiflorum*), Panico (*Panicum* sp.), Poa (*Poa annua*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo (*Polygonum convolvulus*), Portulaca (*Portulaca oleracea*).
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI: Erba morella (*Solanum nigrum*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Stellaria (*Stellaria media*).

Modalità d'impiego

Per una distribuzione uniforme usare un quantitativo d'acqua di 200-400 l/ha, in funzione delle caratteristiche dell'attrezzatura.

Subito dopo l'applicazione (al massimo entro le 4 ore per evitare perdita di efficacia) incorporare omogeneamente nel terreno, ad una profondità di 5-15 cm, con varie tipologie di erpici o di organi rotanti.

Per una buona incorporazione è necessario procedere su terreno ben preparato e senza zolle.

GOWAN ITALIA S.r.l.
Via Morgagni 68 - Faenza (RA)
Tel. 0546 629911 - Fax 0546 623943
gowanitalia@gowanitalia.it - www.gowanitalia.it

Gowan®
ITALIA
l'affidabilità in agricoltura



skeda.com - 02/21