ANTENE® S

Fungicida antioidico in sospensione concentrata

CONSENTITO L'IMPIEGO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

NEW

1L 10L

- Fungicida a base di zolfo in **formulazione liquida**, con particelle finemente micronizzate, di elevata stabilità e distribuzione omogenea nella dispersione.
- Formulazione a base acqua, inodore, che non contiene solventi e garantisce elevata disperdibilità in botte ed un'**uniforme copertura della vegetazione trattata**
- Grazie alla presenza di un surfattante specifico è dotato di ottima **miscibilità, adesività e persistenza** anche a seguito di diverse bagnature
- Autorizzato su vite e tutti i principali campi d'impiego, **agisce attivamente verso tutte le forme di oidio** con meccanismo aspecifico, risultando il partner ideale delle molecole ad azione monosito.

Tipo di formulazione
Sospensione concentrata (SC)

Contiene
Zolfo puro g. 56,09 (800 g/l)
Coformulanti ed inerti: q.b. a g. 100

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSI (L/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	NR. MAX APPLIC.	INT.	VOLUMI (L)
Vite	Oidio *(Erysiphe necator)*	3-4	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	8	7	500-1000
Pomacee	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis, Venturia pyrina),* Oidio *(Podosphaera leucotricha, Phyllactinia mali),* Eriofidi *(Eriophyes pyri)*	3-4	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	8	7	500-1000
Drupacee	Oidio *(Podosphaera sp.),* Bolla *(Taphrina deformans)*	3-4	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	8	7	500-1000
Nocciolo	Oidio *(Phyllactinia corylicola),* Eriofidi *(Phytoptus avellanae)*	3-4	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	8	7	500-1000
Pomodoro e altri ortaggi a frutto (Solanacee, Cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile) (in pieno campo e serra)	Oidio *(Leveillula taurica, Golovinomyces sp., Podosphaera sp., Sphaerotheca fuliginea)*	2	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	6	10	400-1500
Cavoli, Ortaggi a stelo (in campo)	Odio *(Erysiphe cruciferarum, Leveillula taurica)*	2	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	6	10	400-1500
Legumi freschi e da granella (in campo)	Oidio *(Erysiphe pisi)*	2	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	6	10	400-1500
Floreali ed Ornamentali (in pieno campo e serra), Forestali	Peronospora *(Peronospora destructor),* Alternaria *(Alternaria spp.),* Batteriosi *(Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)*	3	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	5	10	400-1500
Pomodoro, Melanzana (in serra e pieno campo)	Oidio *(Blumeria graminis)*	8-10	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	4	10	150-500

TEMPI DI CARENZA

Vite, Pomacee, Drupacee, Nocciolo, Cereali	5 giorni
Pomodoro, Ortaggi a frutto (Solanacee, Cucurbitacee a buccia edibile e non edibile), Cavoli, Ortaggi a stelo, Legumi freschi e da granella.	3 giorni