

- LINEA DIFESA MAIS -



Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Prestare attenzione alle indicazioni di pericolo. Per la composizione dei prodotti consultare i riferimenti riportati sul catalogo e sul sito Chimiberg.



WWW.CHIMIBERG.COM - WWW.DIACHEMITALIA.IT

CHIMIBERG e DIAGRO marchi di **DIACHEM** S.p.A.



- LINEA DIFESA MAIS -

TRATTAMENTI ALLA SEMINA

EPOCA DI INTERVENTO	TARGET	FORMULATI E DOSI
Distribuzione localizzata alla semina	Effetto Starter	 FERTISTAR ZM+3E (25-40 kg/ha)
	Protezione da insetti terricoli + Effetto starter	DIASTAR MAXI (12-15 kg/ha; fino a 20 kg/ha) TEFLUSTAR (30-40 kg/ha; fino a 50 kg/ha)
	Protezione da insetti terricoli	UNDERLINE 0,2 G (30-40 kg/ha; fino a 50 kg/ha)

DISERBO DI PRE-EMERGENZA/POST-EMERGENZA PRECOCE

EPOCA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INFESTANTE	FORMULATI E DOSI
Pre emergenza del mais con infestanti in fase di germinazione o di plantula	Soluzione completa a 4 vie per il controllo delle infestanti del mais: costante efficacia anche su infestanti difficili con azione rafforzata verso Poligonacee, <i>Portulaca</i> , <i>Solanum</i> e <i>Xanthium</i>	MARKER DUO + CLIVIS DUO 
Post-emergenza precoce del mais con infestanti in fase di germinazione o di plantula	Infestazioni miste in presenza delle principali infestanti graminacee e dicotiledoni annuali, con azione prolungata nei confronti di <i>Abutilon theophrasti</i> ed altre infestanti a nascita scalare	MARKER DUO (2-2,8 l/ha)

DISERBO DI POST-EMERGENZA

EPOCA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INFESTANTE	FORMULATI E DOSI
Post-emergenza del mais (fino a 6 foglie vere) con infestanti emerse nelle prime fasi di sviluppo	Dicotiledoni annuali e perenni, anche in presenza di ruderali (<i>Abutilon theophrasti</i> , <i>Xanthium</i>)	JOKER (0,8-1,2 l/ha) JOKER 480 (0,4-0,6 l/ha) MAISOT (1,5 l/ha) SULCOCAP (1-1,5 l/ha) 
	Infestazioni graminacee	SIMUN 40 OD (1-1,5 l/ha)
	Infestazioni miste in presenza di Sorghetta da rizoma ed altre graminacee	MAZICA (440 g/ha) 

DIFESA DAGLI INSETTI IN VEGETAZIONE

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITÀ	FORMULATI E DOSI
Post-emergenza della coltura, intervenendo in presenza dell'insetto o al superamento delle soglie di danno	Afidi, Nottue, Piralide, Diabrotica (contro Piralide intervenire sempre prima della penetrazione delle larve negli stocchi; in caso di ovideposizioni scalari è consigliabile l'aggiunta di un formulato ad azione ovicida)	METEOR (0,6-0,8 l/ha) JUDO (0,2-0,25 l/ha)

COADIUVANTI

In associazione ad agrofarmaci	Come bagnante in aggiunta a diserbanti (solfoniluree e ormonici)	VECTOR (1 l/ha)
	Come bagnante in aggiunta a insetticidi (piretroidi)	VECTOR (0,5 l/ha)

CHIMIBERG e DIAGRO marchi di **DIACHEM** S.p.A.

Uffici e stabilimento:

Via Mozzanica, 9/11 - 24043 CARAVAGGIO (BG)

Tel. 0363 355611

info@chimiberg.com - info@diagro.it - www.diachemitalia.it

Azienda con Sistema di Gestione Certificato:

QUALITÀ ISO 9001, SICUREZZA ISO 45001, AMBIENTE ISO 14001

Organismo di Certificazione: SGS ITALIA S.p.A.

