

TeloneTM II 2021



Autorizzazione eccezionale

Nematocida fumigante ad ampio spettro

TELONETM II 2021 è indicato per la lotta a tutte le specie di Nematodi che formano galle (*Meloydogyne spp.*), cisti (*Heterodera spp.*), lesioni (*Pratylenchus spp.*) ed in generale a tutte le anguillule che infestano terreni in assenza di coltura.

Compatibilità

Il prodotto si impiega da solo.

Fitotossicità

Essendo i vapori del prodotto fitotossici i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

Avvertenze

Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontano dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Durante la manipolazione e l'applicazione del prodotto e durante le operazioni di rimozione del film plastico ricoprente il suolo usare un apparecchio respiratorio adatto dotato di filtro specifico per i vapori organici, indumenti protettivi e guanti adatti.

Dopo la rimozione del film plastico per i successivi 10 giorni non rientrare nelle zone trattate senza questi strumenti di protezione.

Segnalare l'area trattata con apposite tabelle e garantire il rispetto di una distanza non inferiore a 20 metri dagli astanti durante l'applicazione del prodotto.

I fusti contenenti il prodotto, in fase di prelievo, debbono essere posizionati all'interno di un bacino di contenimento di materiale adatto e volume idoneo.

Modalità d'impiego

Uso consentito in pieno campo su terreno in assenza di coltura.

Rispettare un intervallo di 2 anni tra un trattamento e l'altro.

Per prevenire le eventuali perdite del fumigante e per assicurarsi che una efficace concentrazione di prodotto rimanga nel terreno per un periodo più prolungato, **si deve applicare il prodotto tramite macchina fumigatrice** e si suggerisce la copertura del suolo con telo pacciamante non forato, debitamente fissato al suolo per evitare il rigonfiamento dovuto alle correnti d'aria e la conseguente perdita di prodotto.

Tempo di permanenza del telo: 14/21 giorni.

Quando la copertura deve essere rimossa, procedere prima a sollevare i margini interrati e, dopo 12-24 ore, l'intero telo di plastica.

Semina-trapianto: ad una distanza di 14/21 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura o una erpicatura profonda allo scopo di liberare il terreno da vapori residui. La semina o il trapianto devono essere eseguiti 14/21 giorni dopo l'areazione del terreno ed almeno 31 giorni dopo il trattamento.

Intervallo di sicurezza: dal momento del trattamento far trascorrere 14/21 giorni per l'eliminazione del film plastico e almeno 31 giorni per le semine e o i trapianti.

Colture	Periodo d'autorizzazione	Dosi (L/ha)
Melanzana, Tabacco, Patata da seme	dal 25/03/2021 al 01/07/2021	140
Basilico, Melone	dal 28/04/2021 al 01/08/2021	140
Carota, Fragola	dal 01/06/2021 al 01/10/2021	140
Pomodoro	dal 15/07/2021 al 15/11/2021	180
Peperone, Barbabetola da zucchero da seme	dal 15/07/2021 al 15/11/2021	140
Floreali	dal 01/09/2021 al 01/01/2022	140

Consultare l'etichetta per le fasce di rispetto non trattate e altri dettagli o avvertenze.



Composizione

1,3 Dicloropropene
(1178,5 g/l)

97%

Formulazione

Liquido

Confezioni

60 L
200 L

Registrazione

n° 17833 del 25.03.2021



NEMATOCIDA

TeloneTM II 2021:
marchio registrato della The Dow Chemical Company ("Dow")