TOSCANA

COMPOSIZIONE

FORMULAZIONE

CONFEZIONI

Tribenuron metile g 75

Granuli idrodisperdibili

bustina 10 g

CLASSIFICAZIONE ATTENZIONE

REGISTRAZIONE Min. San. n. 16042 del 21/10/2014





CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

È un erbicida sistemico di post-emergenza a rapida degradazione, attivo anche a basse disi di impiego e temperature, particolamente indicato per interventi precoci (infestanti giovani, in fase di attiva cescita) su frumento ed orzo. Lo sviluppo delle malerbe sensibili, infatti, si arresta poche ore dopo il trattamento, sebbene il dissecamento completo si osservi dopo 10-20 gg. Le infestanti che non disseccano si indeboliscono risultando, comunque, assai meno competitive nei confronti della coltura. Agisce efficacemente su infestanti emerse soprattutto se impiegato nel periodo compreso da stadio di 3 foglie a quello di botticella delle colture. Trattamenti precoci su giovani malerbe consentono l'uso de dosi più basse. Dopo l'applicazione non effettuare trasemina di leguminose e foraggere. Si raccomanda l'aggiunta di un bagnante non ionico. In caso di misce aggiungere l'atro prodotto quando TOSCANA già completamente disciolto quindi, in ultimo, il bagnante.orzo. Lo sviluppo delle malerbe sensibili, infatti, si arresta poche ore dopo il trattamento, sebbene il dissecamento completo si osservi dopo 10-20 gg. Le infestanti che non disseccano si indeboliscono risultando, comunque, assai meno competitive nei confronti della coltura. Agisce efficacemente su infestanti emerse soprattutto se impiegato nel periodo compreso da stadio di 3 foglie a quello di botticella delle colture. Trattamenti precoci su giovani malerbe consentono l'uso de dosi più basse. Dopo l'applicazione non effettuare trasemina di leguminose e foraggere. Si raccomanda l'aggiunta di un bagnante non ionico. In caso di misce aggiungere l'atro prodotto quando TOSCANA già completamente disciolto quindi, in ultimo, il bagnante.

Colture	Tempo di carenza	Avversità	Dose d'impiego	Note
FRUMENTO ORZO		Ranuncolo Acetosella Papavero Correggiola Ravanello selvatico Rapistro rugoso Romice Senape selvatica Centocchio comune Veccia Aneto puzzolente Coriandolo fetido Borsa del pastore Fiordaliso Margherita delle me Rughetta Convolvolo nero Fumaria Geranio rosso Fa ortica Camomilla comune Miagro liscio	10-20 g/ha + 0,5-1 I/ha DI PLUVIUM	In post-emergenza delle colture tra lo stadio di 3 foglie e fine accrescimento Non trattare dopo la fine dell'accrescimento