

Twin Pack Mais

Soluzione insetticida in formato Twin Pack composta da Coragen® e Avaunt® EC per il contemporaneo controllo della piralide (*Ostrinia nubilalis*) e degli adulti di diabrotica (*Diabrotica virgifera virgifera*).

COMPOSIZIONE TWIN PACK MAIS (soluzione utile per trattare 4 ettari):

CORAGEN® 400 ml

REGISTRAZIONE N°	13981 del 22/04/2009	CLASSIFICAZIONE CLP  ATTENZIONE
COMPOSIZIONE	Chlorantraniliprole 200 g/l (Rynaxypyr®)	
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata	
GRUPPO IRAC	28	

AVAUNT® EC 1000 ml

REGISTRAZIONE N°	11173 del 05/02/2002	CLASSIFICAZIONE CLP  PERICOLO
COMPOSIZIONE	Indoxacarb 150 g/l	
FORMULAZIONE	Emulsione concentrata (EC)	
GRUPPO IRAC	22A	

DOSAGGIO PER LE APPLICAZIONI FOGLIARI SU MAIS:

CORAGEN®

COLTURA	SPECIE PARASSITA	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Mais	<i>Ostrinia nubilalis</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Sesamia</i> spp., <i>Popillia japonica</i> .	100 ml/ha	Intervenire in fase di ovideposizione o quando sono visibili le primissime rosure.	7 giorni

AVAUNT® EC

COLTURA	SPECIE PARASSITA	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Mais	<i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Ostrinia nubilalis</i> .	250 ml/ha	Per interventi specifici su diabrotica trattare dopo la comparsa degli adulti.	14 giorni

CONSIGLI D'IMPIEGO: Le applicazioni di Twin Pack Mais vanno effettuate quando si hanno le condizioni predisponenti per un contemporaneo controllo della piralide e degli adulti di diabrotica, normalmente alla fine della fioritura del mais. Utilizzare mediamente 300-500 litri di acqua per ettaro, prediligendo trampoli con la manica d'aria che permettano alla soluzione di bagnare bene la pianta, in particolare la spiga e le foglie ad essa vicine, dove si trovano le ovimasse di piralide. Per il controllo della piralide il periodo più adatto è quello detto dell'imbrunimento seta. Prima di programmare il trattamento è opportuno valutare la situazione del parassita in campo e consultare il sistema FMC di monitoraggio insetti "Arc(TM) farm intelligence". Su piralide i differenti modi di azione di Coragen® e Avaunt® EC permettono una azione complementare e prolungata per il controllo sia delle uova che delle larve. Nelle ultime stagioni il momento del trattamento per il contenimento della seconda generazione di piralide è spesso coinciso con il momento migliore per l'abbattimento degli adulti di diabrotica.

COMPATIBILITÀ: Coragen® e Avaunt® EC non sono compatibili con i preparati a reazione alcalina.