

# MERPLUS®

Fungicida con azione di contatto e sistemica. Protegge sia i tessuti di nuova formazione sia quelli già formati, mostrando un'importante efficacia intrinseca nei confronti di patologie chiave delle pomacee. L'importante sinergia tra le due materie attive, l'azione multi-sito e di stimolo delle difese naturali delle piante, lo rendono strategico nei programmi di difesa.



**FORMULAZIONE:**  
Sospensione concentrata

**COMPOSIZIONE:**  
Captano 23,2% (360 g/l)  
Fosfonato di potassio 42,6% (660 g/l)

**FRAC:**  
M4  
P7 (33)

**N. REGISTRAZIONE:**  
16753 del 21-11-2019

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Pero, Melo, Cotogno e Nashi	Ticchiolatura, Maculatura bruna, Cancri e patologie di post-raccolta	3 l/ha (0,2-0,3 l/h)	Effettuare massimo 6 trattamenti l'anno dallo stadio di rottura gemme fino a frutto noce, da limitare a 4 se il periodo di impiego è prolungato fino alla comparsa della specifica colorazione varietale, mantenendo un intervallo di 7-10 giorni.	28 giorni



Avvertenza: **ATTENZIONE**  
H317 - H319 - H332 - H351 - H400

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.