



Superbo[®] 18 EC

Composizione

Abamectina (18 g/l) **1,89%**

Formulazione

Emulsione concentrata

Confezioni



1 L (collo da n° 12 pz.)

5 L (collo da n° 4 pz.)

Registrazione

n° 17705 del 15.10.2020



Insetticida/acaricida ad azione translaminare

Superbo[®] 18 EC è un insetticida e acaricida, concentrato emulsionabile ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto. Prodotto contenente abamectina, principio attivo efficace nei confronti di tutte le forme mobili di insetti ed acari.

Una scelta vincente

Numerosi impieghi autorizzati. Protezione completa e prolungata delle colture.

Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (ml/hl)	Dosi (L/ha)	Note	N° tratt./anno	Periodo carenza
Agrumi (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone)	Minatrice serpentina	40	0,3-0,8	Alla comparsa delle prime mine sui getti nuovi in formazione.	1-3 ogni 7 gg.	10 gg.
	Ragnetti rossi	40	0,4-0,8	Alla comparsa delle prime forme mobili.		
Melo	Ragnetti rossi	80	0,6-0,96	Da fine caduta petali alla comparsa dei fitofagi.	1-2 ogni 15 gg.	3 gg.
Pero	Psylla	50-100	0,375-1,2	A fine caduta petali o nelle generazioni successive alla comparsa delle prime neanidi.	1-2 ogni 15 gg.	3 gg.
	Ragnetti rossi	80	0,6-0,96	A fine caduta petali oppure alla comparsa delle prime forme mobili.		
Pesco	Ragnetti rossi	50-100	0,5-1,2	A fine caduta petali alla comparsa delle prime forme mobili.		14 gg.
Vite da vino	Ragnetti rossi	50-100	0,25-1,0	Alla comparsa delle prime forme mobili.		10 gg.
Vite da tavola	Ragnetti rossi	50-100	0,5-1,2	Alla comparsa delle prime forme mobili.		10 gg.
Pomodoro (in pieno campo e serra)	Ragnetti rossi, Eriofide (solo per trattamenti in serra)	50-100	0,15-1,0	Alla comparsa delle prime forme mobili.	1-3 ogni 7 gg.	3 gg.
	Minatrici fogliari	50-100	0,15-1,0	Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.		
Melanzana (in pieno campo e serra)	Ragnetto rosso	50-80	0,15-0,8	Alla comparsa delle prime forme mobili.	1-3 ogni 7 gg.	3 gg.
Melone, Zucca, Cocomero (in pieno campo* e serra**); Cetriolo, Cetriolino, Zucchini (in serra)**	Ragnetto rosso	50-100	0,15-1,0	Alla comparsa delle prime forme mobili.	1-2 ogni 7 gg.	*: 5 gg. **: 3 gg.
	Minatrici fogliari	50-100	0,15-1,0	Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.		
Fragola (in serra)	Ragnetti rossi e gialli	50-100	0,15-1,0	Alla comparsa delle prime forme mobili.	1-2 ogni 7 gg.	3 gg.
	Minatrici fogliari	50-100	0,15-1,0	Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.		
Lattughe e insalate (in pieno campo) <i>escluse Crescione ed altri germogli e gemme, Barbarea, Rucola, Senape Juncea</i>	Ragnetti rossi e gialli	50-100	0,15-1,0	Alla comparsa delle prime forme mobili.	1-3 ogni 7 gg.	7 gg.
	Minatrici fogliari	50-100	0,15-1,0	Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.		
Mais	Ragnetti rossi	100	0,3-0,4	Alla comparsa delle prime forme mobili fino alla fase di 6° foglia distesa.	1	-

Per trattamenti in serra su Melone, Cocomero, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Zucchini e Fragola non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio.

Avvertenze

Per raggiungere la massima mortalità dei fitofagi possono essere necessari anche 3-5 giorni in seguito all'intervento. Dopo l'applicazione gli insetti e gli acari riducono sensibilmente l'alimentazione, quindi il danno procurato in questa epoca è minimo.

Si raccomanda di usare il prodotto secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'impiego di altri prodotti efficaci con diverse modalità di azione. Non applicare Superbo 18 EC più di due volte in successione.

Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare in presenza di api. Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore o eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

Per applicazioni in serra rispettare un periodo di 4 giorni prima di permettere il rientro degli insetti impollinatori e di 14 giorni per l'introduzione di insetti utili.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni sopri riportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.

Superbo[®] 18 EC: marchio registrato Gowan Italia.