



CYMBAL

**FUNGICIDA CITOTROPICO TRANSLAMINARE
AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA NEI
CONFRONTI DELLE PERONOSPORACEE CHE
ATTACCANO VITE, ORTICOLE, TABACCO E ROSA**

CYMBAL è un fungicida attivo sia nei confronti della peronospora della vite, sia nei confronti di altre peronosporacee che attaccano le colture sopra indicate. Agisce in un duplice modo: per contatto nei confronti degli elementi di propagazione della peronospora (zoospore) e con azione endoterapica nei confronti del micelio, che si sviluppa all'interno della lamina fogliare.



COMPOSIZIONE

Cimoxanil puro 45 %

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili (WG)

MECCANISMO D'AZIONE

FRAC CODE 27

CLASSIFICAZIONE CLP

Attenzione



REGISTRAZIONE

n. 13489 del 26/08/2009 (Titolare della registrazione BELCHIM CROP PROTECTION ITALIA S.p.A.)



CYMBAL è il **perfetto partner** per la maggior parte degli antiperonosporici presenti sul mercato. Ti aiuta ad avere **eccellenti risultati** nelle situazioni più difficili.



Per visualizzare l'etichetta, la scheda di sicurezza e altro materiale, scarica la BELCHIM ITALIA APP inquadrando il QR CODE

CONFEZIONE



500 g

COLTURA	AVVERSITÀ	NOTE	DOSE	TEMPO DI CARENZA		
VITE	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	Da inizio infezione fino a fine fioritura	40 - 50 g/hl	10 gg		
		Da allegagione fino a chiusura grappolo	30 - 35 g/hl			
CARCIOFO	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)			21 gg		
LATTUGA	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)			7 gg		
SPINACIO	Peronospora (<i>Peronospora farinosa</i>)			10 gg		
MELONE	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			3 gg		
ZUCCHINO, CETRIOLO (serra)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)					
PISELLO (esclusi piselli da granella secchi e piselli con baccello)	Peronospora (<i>Peronospora pisi</i>)			-	40 - 50 g/hl	10 gg
AGLIO E CIPOLLA	Peronospora (<i>Peronospora schleideni</i>)					7 gg
PORRO	Peronospora (<i>Phytophthora porri</i>)					
PATATA	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)					
POMODORO	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)					
TABACCO	Peronospora (<i>Peronospora tabacina</i>)	-				
ROSA	Peronospora (<i>Peronospora sparsa</i>)					

AVVERTENZE AGRONOMICHE

In caso di malattia in atto, intervenire con 2 trattamenti ravvicinati, alla dose più alta. Nel caso specifico di AGLIO e CIPOLLA si consiglia l'associazione con bagnanti ed adesivanti a causa dell'alto contenuto di cere presente sulle foglie.

Cymbal va impiegato in miscela con fungicidi multisito o con altro meccanismo d'azione. La dose minima per ettaro non deve essere inferiore a 250 g.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto e sui simboli.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Salvo errori e omissioni, i dati riportati in questo catalogo fanno riferimento
a quanto in vigore al momento della conclusione del progetto grafico - 31/10/2021