

CALENDARIO FENOLOGICO DIFESA VITE

AVVERSITÀ																		
PERONOSPORA <i>(Plasmopara viticola)</i>						Electis [®] Trio WDG												
						Zoxium [®] 240 SC + partner												
			Fantic [®] F NC WG	OPPURE	Electis [®] R FLOW				Electis [®] R FLOW									
			Genkotsu [®]						Genkotsu [®]									
			linea Airone [®]															
OIDIO <i>(Uncinula necator)</i>				 Ibisco [®] 														
			Tioflor [®] WDG											OPPURE	Antene [®] S 			
				Domark [®] 125 Plus								IN STRETTA ALTERNANZA CON	Nabucco [®]					
		Regnum [®] 25 EC									Regnum [®] 25 EC							
BOTRITE <i>(Botrytis cinerea)</i>							 POLYVERSUM [®] 											
							Electis [®] Trio WDG		OPPURE	Fantic [®] F NC WG		Zoxium [®] 240 SC + partner		OPPURE	Presidium [®] ONE		Efficace anche contro Marciume acido	
							Soluzioni antiperonosporiche con attività collaterale contro Botrite											
Altre avversità	 Remedier [®]	MAL DELL'ESCA				TRIPIDI, ACARI, ERIOFIDI	UVA DA TAVOLA Dicarzol [®] 750 SP*		SCAFOIDEO E CICALINE	 Enelse [®] 								
					TIGNOLE	 Astrel [®] WDG 												
Efficienza trattamenti	 MAGO [®] in miscela con Fungicidi e Insetticidi 																	

DIFESA VITE: tante soluzioni d'eccellenza per una produzione sostenibile



ELECTIS® TRIO WDG

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili
Zoxamide 3,6% + Cimoxanil 2,8% + Fosetil AI 35%
INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg.
DOSE D'IMPIEGO 4-5 kg/ha



PRESIDIUM® ONE

FORMULAZIONE Sospensione concentrata
Zoxamide (180 g/l) 16,7% + Dimetomorf (180 g/l) 16,5%
INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg.
DOSE D'IMPIEGO 1 L/ha



REBOOT®

FORMULAZIONE Granuli dispersibili
Zoxamide 33% + Cimoxanil 33%
INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg.
DOSE D'IMPIEGO 400-450 g/ha



AIRONE® PIÙ

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili
Rame metallo 28% (ossicloruro 14% + idrossido 14%)
INTERVALLO DI SICUREZZA 20 gg.
DOSE D'IMPIEGO 1,7-2,7 kg/ha



FANTIC® F NC WG

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili
Benalaxyl-M 3,75% + Folpet 48%
INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg.
DOSE D'IMPIEGO 2 kg/ha



DOMARK® 125 PLUS

FORMULAZIONE Microemulsione
Tetraconazolo (125 g/l) 11,6%
INTERVALLO DI SICUREZZA 30 gg.
DOSE D'IMPIEGO 240 ml/ha



REGNUM® 25 EC

FORMULAZIONE Emulsione concentrata
Pyraclostrobin (250 g/l) 23,6%
INTERVALLO DI SICUREZZA 35 gg. da vino, 49 gg. da tavola
DOSE D'IMPIEGO 400 ml/ha



IBISCO®

FORMULAZIONE Liquida
COS-OGA (12,5 g/l) 1,25%
INTERVALLO DI SICUREZZA 0 (zero) gg.
DOSE D'IMPIEGO 2-3 L/ha



POLYVERSUM®

FORMULAZIONE Polvere bagnabile
Pythium oligandrum (ceppo M1) - min. 1x10⁶ UFC/g
INTERVALLO DI SICUREZZA 0 (zero) gg.
DOSE D'IMPIEGO 200-300 g/ha



REMEDIER®

FORMULAZIONE Polvere bagnabile
Trichoderma asperellum 2% + T. gamsii 2% - min. 3x10⁷ UFC/g
INTERVALLO DI SICUREZZA 3 gg.
DOSE D'IMPIEGO 250 g/hl (min. 1 kg/ha)



MAGO®

FORMULAZIONE Liquido
Sorbitan mono oleato etossilato (120 g/l) 12%
INTERVALLO DI SICUREZZA -
DOSE D'IMPIEGO 50-150 ml/hl



ASTREL® WDG

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, ceppo ABTS 351 54%
INTERVALLO DI SICUREZZA -
DOSE D'IMPIEGO 0,5-1 kg/ha



ENELSE®

FORMULAZIONE Concentrato emulsionabile
Piretrine pure (20 g/l) 2,14%
INTERVALLO DI SICUREZZA 3 gg.
DOSE D'IMPIEGO 0,7-1,5 L/ha



Apri il QRcode e leggi
l'approfondimento sulla
gamma completa "Difesa Vite"

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Usare con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FORM.	INTERVALLO DI SICUREZZA	DOSE
AIRONE® EXTRA	Rame ossicloruro 10% + idrossido 20%	WDG	21 gg.	1-1,5 kg/ha
AIRONE® LIQUIDO	Rame metallo (272 g/l) 20% (ossicloruro 10% + idrossido 10%)	SC	20 gg.	2-4 L/ha
ANTENE® S	Zolfo (800 g/l) 56,09%	SC	5 gg.	3-4 L/ha
ELECTIS® R FLOW	Zoxamide (40 g/l) 2,85% + Rame (solfato tribasico) (266 g/l) 19,1%	SC	28 gg.	3 L/ha
NABUCCO®	Metrafenone (500 g/l) 42,37%	SC	28 gg.	0,25 L/ha
TIOFLOR® WDG	Zolfo 80%	WDG	5 gg.	3-4 kg/ha
ZOXIUM® 240 SC	Zoxamide (240 g/l) 21,8%	SC	28 gg.	0,625-0,75 L/ha
DICARZOL® 50 SP	Formetanate 50%	PB-SI	Inizio fioritura	1 kg/ha
Uva da tavola				