SELECTA DISPERSS®

SELECTA DISPERSS® è una formulazione sovra-neutralizzata a base di brochantite (solfato tribasico di rame). Grazie agli elevati standard tecnologici del processo produttivo, **SELECTA DISPERSS®** si caratterizza per il lento rilascio di ioni rame. La riduzione del rischio di fitotossicità ne permette quindi l'impiego contro le batteriosi delle drupacee in vegetazione e sulle colture notoriamente sensibili al rame.

COMPOSIZIONE	Rame metallo puro 20% (da solfato tribasico)
FORMULAZIONE	Granuli idrodispersibili
INTERVALLO DI SICUREZZA	21 gg per drupacee; 14 gg per cavoli; 15 gg actinidia; 7 gg per pomacee.
N° DI REGISTRAZIONE	13741 del 01.04.2007
CONFEZIONE	kg 5
INDICAZIONI DI PERICOLO	**ATTENZIONE** H302 - H410 - EUH401

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (Kg/ha)	DOSE (g/hL)	NOTE
Pomacee*	Ticchiolatura, Batteriosi, Cancri rameali	1 - 5	70 - 330	Da mazzetti divaricati a raccolta. Intervallo minimo: 5 giorni.
		2,5 - 7,5	170 - 500	Dall'inizio della caduta delle foglie alla comparsa dei mazzetti fiorali. Intervallo minimo: 5 giorni.
Drupacee	Bolla del pesco, Monilia**, Corineo, Batteriosi, Cancri, Nerume, Cilindrosporiosi	2,5 - 5	170 - 300	Trattamenti da inizio a fine caduta foglie. Intervallo minimo: 5 giorni.
		4 - 7	270 - 470	Dalla caduta foglie alla prefioritura. Intervallo minimo: 5 giorni.
		1 - 2	200 - 600	Trattamenti in vegetazione. Max 6 applicazioni per stagione. Al fine di prevenire o limitare fortemente fenomeni di fitotossicità, evitare gocciolamenti e/o anomali accumuli di prodotto sulla vegetazione adottando volumi d'irrorazione ridotti rispetto a quelli normali. In ogni caso modulare il numero delle applicazioni in base alla pressione dei patogeni e alla lunghezza del ciclo colturale della varietà in questione. Intervallo minimo: 5 giorni.
Actinidia	Batteriosi	5,0 - 7,4	500 - 740	Da caduta foglie alla ripresa vegetativa. Intervallo minimo: 7 giorni.
		1,0 - 2,5	100 - 250	Da ripresa vegetativa alla raccolta. Intervallo minimo 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire solo in caso di violente grandinate o condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Cavoli (pieno campo) **Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolini di Bruxelles**	Peronospora, Batteriosi	2,5 - 5	250 - 500	Intervallo minimo: 5 giorni.

* fare attenzione alle varietà sensibili al rame - ** effetto collaterale

@ - Maggiori dettagli a pag.9

- **Elevata selettività**
- **Attività fungicida e batteriostatica**
- **Formulazione Disperss®**
- **Utilizzabile in agricoltura biologica**

