



**È ARRIVATA LA SOLUZIONE CHE ASPETTAVI
PER IL CONTROLLO DEGLI ACARI**



**Nuove
estensioni di
impiego su
solanacee,
cucurbitacee e
piccoli frutti**



CERTIS BELCHIM B.V. – ITALIA

Via Varese, 25D scala A
21047 Saronno (VA) - Italia
+39 02 96 099 83
info.it@certisbelchim.com
www.certisbelchim.it



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SUI SIMBOLI.
SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SULLE FRASI E SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA.

ORIGINE NATURALE

MILBEKNOCK® è un acaricida a base di Milbemectina, una sostanza attiva naturale prodotta dalla fermentazione del microrganismo del suolo *Streptomyces hygroscopicus*.

AMPIO SPETTRO DI EFFICACIA

MILBEKNOCK® garantisce un'elevata azione acaricida nei confronti dei più importanti target che infestano le colture autorizzate; in particolare, risulta altamente efficace nei confronti del raghetto rosso (*Tetranychus urticae*) e dell'acaro rugginoso del pomodoro (*Aculops lycopersici*). Il prodotto, inoltre, è attivo verso alcuni minatori fogliari (*Phyllocnistis citrella* e *Liriomyza* spp.)

MECCANISMO D'AZIONE

La Milbemectina ha un meccanismo d'azione unico che lo differenzia dagli altri acaricidi presenti sul mercato. Inibitore del GABA (Acido Gamma Ammino Butirrico), mediatore della trasmissione nervosa, **provoca inizialmente la paralisi dell'acaro, quindi la cessazione dell'alimentazione e la successiva morte.**



PUNTI DI FORZA

- Elevata efficacia nei confronti di tutti gli stadi di sviluppo degli acari (uova, larve, ninfe e adulti)
- Azione per contatto e per ingestione con un efficace effetto knock-out.
- Rapida azione translaminare con un ottimale e persistente controllo dell'infestazione.
- Ottimo profilo residuale.

COLTURA	PARASSITA	DOSE MAX (L/ha)	DOSE (mL/hL)
MELO	Raghetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>)	1,875	100 - 125
ARANCIO, MANDARINO	Raghetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>) Raghetto rosso degli agrumi (<i>Panonychus citri</i>) Minatrice serpentina degli agrumi (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	3	150
POMODORO, MELANZANA (SERRA)	Eriofide rugginoso del pomodoro (<i>Aculops lycopersici</i>) Raghetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)	1,875 (0,75 L/ha LWA)	100 - 187
POMODORO, MELANZANA (CAMPO)	Eriofide rugginoso del pomodoro (<i>Aculops lycopersici</i>) Raghetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)	1,25	125 - 250
ZUCCHINO (CAMPO E SERRA)	Raghetto (<i>Tetranychus</i> spp.)	1,25	125 - 250
CETRIOLO, CETRIOLINO (SERRA)	Raghetto (<i>Tetranychus</i> spp.)	1,875 (0,75 L/ha LWA)	100 - 187
CETRIOLO, CETRIOLINO (CAMPO)	Raghetto (<i>Tetranychus</i> spp.)	1,25	125 - 250
FRAGOLA (CAMPO E SERRA)	Raghetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>) Acaro pallido del ciclamino (<i>Phytonemus pallidus</i>)	1,25 campo 0,9 serra	125 - 150
PICCOLI FRUTTI E BACCHE: MORE, LAMPONI, MIRTILLI, RIBES, UVA SPINA E ALTRI (CAMPO E SERRA)	Raghetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	1,25	125 - 250
FLOREALI E ORNAMENTALI (CAMPO E SERRA)	Raghetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>) <i>Liriomyza</i> spp.	2	100

CONSIGLI PER L'USO

Applicare **MILBEKNOCK®** all'inizio dell'infestazione avendo cura di bagnare uniformemente la vegetazione. Ripetere, eventualmente, il trattamento a distanza di 7-21 giorni secondo le indicazioni riportate in etichetta. Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza è opportuno impiegare **MILBEKNOCK®** in alternanza con acaricidi appartenenti a differenti meccanismi di azione.

Composizione	Milbemectina (9,3 g/L)
Formulazione	Concentrato emulsionabile (EC)
Meccanismo d'azione	IRAC 6
Classificazione CLP	
Reg. Ministero della Salute	12860 del 23/05/2007
Confezione	1 L

CERTIS BELCHIM B.V. – ITALIA

Via Varese, 25D scala A
21047 Saronno (VA) - Italia
+39 02 96 099 83
info.it@certisbelchim.com
www.certisbelchim.it



Certis Belchim
GROWING TOGETHER