
# **TAKUMI**

Fungicida ad azione preventiva e curativa contro l'oidio





certisbelchim.it





## Fungicida ad azione preventiva e curativa contro l'oidio



#### **PERSISTENTE**

Elevata persistenza di azione, agisce anche per effetto vapore



#### **AFFIDABILE**

Non presenta resistenza incrociata con altri antioidici presenti in commercio



#### **FLESSIBILE**

Un solo giorno di carenza per tutte le colture autorizzate

#### **APPLICAZIONE DI TAKUMI**

Takumi è un fungicida con attività preventiva e curativa nei confronti dell'oidio di:

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	TEMPO DI CARENZA	NOTE
CUCURBITACEE: MELONE, COCOMERO, ZUCCA, CETRIOLO, ZUCCHINO (in pieno campo e in serra)	Oidio	150 ml/ha (10-30 ml/hl)	1 gg	Utilizzare la dose consigliata in un volume di acqua di 5-15 hl/ha Iniziare i trattamenti in fase preventiva, ripetendo il trattamento dopo 7 giorni se necessario. In presenza di sintomi si consiglia di miscelare con Karma oppure con Barocco WG.
SOLANACEE: POMODORO E PEPERONE (in pieno campo e in serra)				
FRAGOLA (in pieno campo e in serra)	Oidio	150 ml/ha (15-75 ml/hl)	3gg	Utilizzare la dose consigliata in un volume di acqua di 2-10 hl/ha. Iniziare i trattamenti in fase preventiva, ripetendo il trattamento dopo 7 giorni se necessario.

### **TAKUMI**

Composizione	Ciflufenamid 100 g/l		
Formulazione	Sospensione concentrata		
Avvertenza	ATTENZIONE		
Reg. Ministero della Salute	n. 14940 del 21/11/2011		
Confezione	150 ml (10x150 ml) - 500 ml (10x500 ml)		

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto e sui simboli.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



Certis Belchim BV Italia

Via Varese 25/D Scala A | 21047 Saronno (VA) | Italia +39 02 96 099 83 | info.it@certisbelchim.com | certisbelchim.it