

SHIRUDO

ACARICIDA SELETTIVO AD ALTO EFFETTO ABBATTENTE
SU TUTTI GLI STADI DI SVILUPPO.



Powered with
Tebufenpyrad



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SUI SIMBOLI.
SI RICHAMA L'ATTENZIONE SULLE FRASI E SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA.

LA SCELTA EFFICIENTE E VERSATILE PER LA DIFESA DELLE COLTURE IN QUALUNQUE FASCIA CLIMATICA.

SHIRUDO: SELETTIVO VERSO LA MAGGIOR PARTE DEGLI INSETTI UTILI E IMPOLLINATORI



Amblyseius californicus



Encarsia sp.



Orius sp.




Bombus sp.



Macrolophus sp.


EFFICACE SU TUTTI GLI STADI DI SVILUPPO

Efficace su tutte le fasi vitali degli acari




MODO DI AZIONE

- SHIRUDO funziona per contatto e ingestione.
- Attraverso l'attività translaminare, SHIRUDO può raggiungere gli acari, anche sulle foglie accartocciate.



PERSISTENZA: ATTIVITÀ DI LUNGA DURATA



AMPIO SPETTRO D'AZIONE

	nome comune	nome scientifico
Tetranychidi	acaro rosso degli agrumi	Panonychus citri
	acaro rosso europeo	Panonychus ulmi
	acaro degli agrumi	Eutetranychus banksi
	acaro-ragno a due punte	Tetranychus urticae
	acaro giallo	Eotetranychus carpini
	acaro rosso carminio	Tetranychus cinnabarinus
	acaro biancospino	Amphitetranychus viennensis
	acaro Kanzawa	Tetranychus kanzawai
	ragno della fragola	Phytonemus pallidus
	acaro largo	Polyphagotarsonemus latus
Tarsonemidi	acaro del ciclamino	Phytonemus pallidus

	nome comune	nome scientifico
Eriofidi	eriofidi del pompelmo	Aculops pelekassi
	acari del pomodoro	Aculops lycopersici
	eriofidi del pero	Epitrimerus pyri
	eriofide del melo	Aculus schlechtendali
	eriofide della vite	Colomerus vitis
	acaro della fragola	Phytonemus pallidus
	acaro della ruggine dell'uva	Calepitrimerus vitis
		Eriophyes chibaensis
		Aceria unguiculata

PERCHÉ SCEGLIERE SHIRUDO

- **Acaricida ad ampio spettro:** efficace contro ragnetto rosso e giallo, eriofidi e tarsonemidi con effetti collaterali aggiuntivi su altri parassiti
- **Efficace su tutti gli stadi vitali** degli acari (uova, stadi larvali, adulti)
- L'efficacia e la persistenza non vengono influenzate dai parametri ambientali (temperatura, piovge)
- **Azione translaminare:** azione sugli acari anche non direttamente investiti dal trattamento
- Rapido **effetto abbattente**
- Attivo per **contatto e ingestione**
- **Selettivo** su molti insetti utili e impollinatori
- Assicura un'azione di **lunga resistenza**

REGISTRAZIONI IN ETICHETTA

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	TEMPO DI CARENZA
POMACEE	<i>Panonychus ulmi, Tetranychus urticae</i>	0,50 kg/ha	7 gg
DRUPACEE (PESCO, NETTARINO)		0,65 kg/ha	14 gg
SUSINO		0,50 kg/ha	21 gg
AGRUMI	<i>Tetranychus urticae, Panonychus citri, Eotetranychus banksi</i>	1,00 kg/ha	7 gg
VITE	<i>Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini, Tetranychus urticae, Calepitrimerus vitis</i>	0,50 kg/ha	14 gg
POMODORO, MELANZANA (in serra)	<i>Tetranychus urticae</i>	1,00 kg/ha	3 gg
CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO (in pieno campo e serra)			
MELONE, COCOMERO (in serra)			
FRAGOLA (in serra)	<i>Tetranychus urticae, Steneotarsonemus pallidus</i>		

SHIRUDO

Composizione	Tebufenpyrad puro 20%
Formulazione	Polvere bagnabile (WP)
Meccanismo d'azione	Gruppo IRAC 21A
Classificazione CLP	Attenzione   
Reg. Ministero della Salute	N. 8937 del 01/10/1996
Confezione	1 Kg

CERTIS BELCHIM B.V. – ITALIA

Via Varese, 25D scala A
21047 Saronno (VA) - Italia
+39 02 96 099 83
info.it@certisbelchim.com
www.certisbelchim.it



Certis Belchim
GROWING TOGETHER