

Gunner Complex

COMBINAZIONE IN TWIN PACK DI FUNGICIDI ANTIOIDICI AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA E BLOCCANTE PER IL CONTROLLO DEL MAL BIANCO DELLA VITE

CARATTERISTICHE

GUNNER COMPLEX è la nuova combinazione in confezione twin pack indivisibile di due fungicidi per la lotta al mal bianco della vite da vino e da tavola: Gunner SC, fungicida sistemico a base di tebuconazolo e Karamat M, fungicida di contatto costituito dalla nuova sostanza attiva Meptyldinocap. **GUNNER COMPLEX** garantisce una azione multisito, con attività preventiva sia sulla vegetazione trattata che su quella in via di sviluppo, grazie alla sistemica del tebuconazolo, curativa ed eradicante sulle infezioni in atto, grazie all'effetto fungitossico di meptyldinocap. La miscela risulta efficace anche alle basse temperature, perfettamente selettiva nei confronti della coltura e degli organismi utili e risulta perciò impiegabile in fase di accrescimento dei germogli. Fondamentale per prevenire lo sviluppo delle infezioni estive nel periodo compreso fra allegagione e chiusura grappolo, quando è necessario bloccare le infezioni in atto.



COMPOSIZIONE

GUNNER SC	Tebuconazolo	g	4,65 (48 g/l)
KARAMAT M	Meptyldinocap	g	35,71 (350 g/l)

REGISTRAZIONE

Gunner SC n.12298 del 05/03/2008
Karamat M n.14854 del 08/02/2010

CLASSIFICAZIONE

Gunner SC Attenzione: Manipolare con prudenza
Karamat M Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente)

AVVERTENZE

L'utilizzo di Meptyldinocap è consentito per un massimo di 4 trattamenti all'anno.

FORMULAZIONE

Gunner SC Sospensione concentrata
Karamat M Emulsione concentrata

CONFEZIONE

Twin pack indivisibile per 2 ettari
(composto da **Gunner SC** 3 litri + **Karamat M** 0,8 litri)

CARENZA

Gunner SC Vite: **14 giorni**
Karamat M Vite: **21 giorni**

L'utilizzo in abbinamento rende necessario rispettare il tempo di carenza più lungo (21 giorni)

COLTURE	PATOGENI	DOSI	NOTE
VITE DA UVA E DA VINO	Uncinula necator (oidio della vite)	Gunner SC 1-1,5 l/Ha + Karamat M 0,3-0,4 l/Ha Interventi preventivi da germogliamento a grappoli visibili	A causa della ridotta superficie fogliare si consiglia di impiegare un ridotto volume di acqua e localizzare il prodotto sulla giovane vegetazione per evitare deriva. In caso di forte presenza della malattia nell'anno precedente, si consiglia un secondo intervento a 12-14 giorni dopo il primo.
		Gunner SC 1,5 l/Ha + Karamat M 0,4 l/Ha Interventi preventivi da allegagione a pre-chiusura grappolo	Eseguire interventi a distanza di 12-14 giorni per proteggere la giovane vegetazione e bloccare eventuali sviluppi della malattia.
		Gunner SC 1,5 l/Ha + Karamat M 0,4 l/Ha Interventi curativi e bloccanti da allegagione a pre-chiusura grappolo	Eseguire 2 interventi a distanza di 5-6 giorni a dosi massime, usando un volume di acqua idoneo a bagnare bene tutta la vegetazione, in particolare le zone più esposte alla malattia (interno grappoli, foglie interne).