

Scudex® & **SCUDEX®** WDG

*La certezza
nella giungla
dei fungicidi
antioidici*



FUNGICIDI
Scudex® wda
SCUDEX® wda
Agrifarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.
Usare con cautela e sempre
leggere attentamente
l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



Scheda tecnica

	Scudex®	Scudex® WDG
Composizione:	Penconazolo puro 10,2%	Penconazolo puro 10%
Formulazione:	Liquido emulsionabile	Granuli idrodispersibili
Indicazione di rischio:	Non classificato	Non classificato
Registrazione Min. San.:	n° 10425 del 29.03.2000	n° 12661 del 18.05.2005
Tempo di carenza:	14 giorni per tutte le colture	
Confezioni:	0,250 - 1 L	1 kg

Caratteristiche

Scudex® e Scudex® WDG appartengono alla famiglia chimica dei triazoli con spiccata azione antioidica e anticicchiolatura. Essendo dotati di elevata sistemica, vengono rapidamente assorbiti dai tessuti vegetali e raggiungono tutti gli organi della pianta. Agiscono sulla germinazione delle spore fungine interferendo sulla biosintesi degli steroli, componenti fondamentali per la vita del fungo. Possiedono attività preventiva, curativa (entro 72-90 ore dalla pioggia infettante) e bloccante.

Perché Scudex®

2 diverse formulazioni (WDG e EC) per soddisfare in modo adeguato le esigenze delle diverse colture:

- **Scudex® ideale per i trattamenti su vite, pesco e colture orticole**
- **Scudex® WDG "vellutato" nei confronti dei più delicati frutti delle pomacee**

Elevata efficacia e flessibilità di impiego

Sfuggono al dilavamento delle piogge

Si acquistano senza patentino

Sono inseriti in tutti i disciplinari di produzione integrata



Modalità d'impiego

Culture	Avversità	Dosi (g-ml/hl)	Note
Vite	Oidio	25-30 15-20 50	Trattamenti preventivi, ogni 12-14 gg. in pre e post fioritura. Trattamenti preventivi, ogni 7-10 gg. in pre e post fioritura. Con attacchi in atto, effettuare 2 trattamenti ogni 5-7 gg., poi ridurre la dose. Attività collaterale contro <i>Guignardia spp.</i> e <i>Pseudopeziza spp.</i>
Melo	Ticchiolatura	30-40 40-50 40-45	Trattamenti preventivi, ogni 6-8 gg. fino a frutto noce, poi ogni 10-12 gg. Trattamenti curativi, entro 72-96 ore da una pioggia infettante. Trattamenti bloccanti, effettuando 2 applicazioni ogni 5-7 giorni.
	Oidio	30-40 30-35	Trattamenti preventivi, in primavera ogni 10 gg., in estate ogni 10-14 gg. Trattamenti bloccanti, effettuando 3-4 applicazioni, ogni 7 giorni.
	Malattie da conservazione	40-45	2-3 trattamenti in pre-raccolta, ogni 7 giorni.
Pero	Ticchiolatura	25-35 30-40 30-40	Trattamenti preventivi, ogni 10-12 gg. Trattamenti curativi, entro 72-96 ore da una pioggia infettante. Trattamenti bloccanti, effettuando 2 applicazioni ogni 5-7 giorni.
Pesco	Oidio	40-50	Trattamenti preventivi, da caduta petali ogni 10-14 giorni.
	Malattie da conservazione	50	2-3 trattamenti in pre-raccolta, ogni 7 giorni.
Melone, Zucchini, Zucca, Cetriolo, Carciofo, Pisello, Peperone (in pieno campo) Pomodoro (in pieno campo)	Oidio	25-50	Secondo la coltura ed il rischio d'infezione. In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione. 2-4 trattamenti preventivi, ogni 12-14 giorni.
Tabacco	Oidio	35-50	2-4 trattamenti preventivi, ad intervalli di 10-14 giorni.
Ornamentali, Fiori	Oidio, Ruggini	25-50	Effettuare saggi varietali di selettività.