



DIFO®



FUNGICIDA SISTEMICO PER LA PROTEZIONE DI MELO, PERO, PESCO, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, COLTURE ORTICOLE, ROSA E GAROFANO

CARATTERISTICHE

DIFO è un fungicida fogliare IBS sistemico ad elevata persistenza ed efficacia protettiva e curativa, indicato per il controllo di Ticchiolatura e Oidio del melo e del pero, Bolla e Monilia del pesco, Cercosporiosi della barbabietola da zucchero ed altre malattie delle colture orticole e di rosa e garofano. DIFO agisce sul fungo inibendo la biosintesi dell'Ergosterolo, componente fondamentale della membrana cellulare, bloccandone pertanto le attività metaboliche, la crescita del micelio e la sporulazione. DIFO viene assorbito dalla vegetazione e traslocato per via traslaminare e sistemica acropeta, sfuggendo così ad eventuali dilavamenti e proteggendo la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento.

AVVERTENZE

DIFO va impiegato rispettando i campi d'impiego, le dosi e le indicazioni di utilizzo riportate in etichetta. In mancanza di opportune specificazioni, attenersi alle comuni prassi di buona pratica agricola.

TRASPORTO ONU

3082

CLASSIFICAZIONE ADR

9

GRUPPO IMBALLAGGIO

III

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA	CONFEZIONE
Barbabietola da zucchero	Cercospora beticola	0,2-0,3 L/Ha	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 15-20 giorni	21 giorni	1 Flacone da 1 L (12x1) 
Melo, Pero	Ticchiolatura, Oidio	15 mL/hL	Massimo 4 trattamenti, in miscela con prodotti di copertura	14 giorni	
Asparago	Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium	0,5 L/Ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni	7 giorni	
Patata, cavolfiore	Alternaria spp, Septoria spp, Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 L/Ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni, in funzione della pressione della malattia	14 giorni	
Sedano				21 giorni	
Carota				7 giorni	
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 L/Ha	3-4 trattamenti a cadenza di circa 10 giorni	7 giorni	
	Alternaria spp, Septoria spp, Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 L/Ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni, in funzione della pressione della malattia	7 giorni	
Cetriolo	Oidi, Alternariosi	0,5 L/Ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni	7 giorni	
Rosa, Garofano	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 mL/hL	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici.	7 giorni	
Pesco	Bolla	20-30 mL/hL	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie	7 giorni	
	Monilia		1-2 trattamenti pre-raccolta		

COMPOSIZIONE

Difenoconazolo 23,23% (250 g/l)

FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile

INDICAZIONI DI PERICOLO



Xn - Nocivo



N - Pericoloso per l'ambiente

N. REGISTRAZIONE

15416 del 18-05-2012