



# MEVAXIL® COBRE

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO PER LA DIFESA DELLA VITE E DELLE COLTURE ORTICOLE



Fungicidi

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite	Peronospora	2,4-4 L/Ha	Applicare dalla fase di pre-fioritura e ad intervalli di 14 giorni in funzione della pressione della malattia	28 giorni
Pomodoro	Peronospora	2 L/Ha	Applicare al verificarsi di condizioni favorevoli all'infezione e ad intervalli di 14 giorni	14 giorni
Fragola	Fitoftora	3-4 L/Ha	Applicare 15-20 giorni dopo l'impianto e 30 giorni dopo. È possibile immergere le piantine prima del trapianto in una soluzione al 3%	40 giorni
Lattuga	Peronospora, Alternaria, Bremia	3-4 L/Ha	Eseguire 2-3 trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni	15 giorni
Melo	Fitoftora	100-150mL/pianta	Applicare nella zona del colletto e sul terreno sottostante, oppure applicare per fertirrigazione. Eventualmente spennellare il tronco con una soluzione al 20%. Sospendere i trattamenti a inizio fioritura	-
Soia	Peronospora, Fitoftora	4 L/Ha	Eseguire 2-3 trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni	150 giorni
Cavolo verza	Peronospora, Alternaria, Bremia	3-4 L/Ha	Eseguire 2-3 trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni	60 giorni

## CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



Tanica da 5 L (4x5)



\* principio attivo originale IQV

COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	INDICAZIONI DI PERICOLO	N. REGISTRAZIONE
Metalaxil* puro 3,5% (49 g/L) + Rame metallo (come idrossido) 18,5% (259 g/L)	Sospensione concentrata	Xi - Irritante  N - Pericoloso per l'ambiente	Reg. n. 14127 del 25-08-2009