

NOTO[®] 40 OD

Erbicida di post-emergenza per il mais a base di Nicosulfuron

NUOVA
FORMULAZIONE

I vantaggi di NOTO[®] 40 OD

- Eccellente controllo della Sorghetta da seme e da Rizoma
- Elevata selettività per la coltura
- Formulazione in Olio Dispersibile pratica e performante

ERBICIDA

NOTO[®]
40 OD

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute.
Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre
l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

 **Gowan**[®]
ITALIA
l'affidabilità in agricoltura

NOTO[®]40 OD è un erbicida sistemico di post-emergenza per il mais che controlla le principali graminacee annuali (*Echinochloa*, *Setaria*, ecc.), la sorghetta da seme e da rizoma e numerose dicotiledoni (*Amaranthus spp.*, *Bidens tripartita*, Crucifere, *Polygonum persicaria*, *P. lapathifolium*, ecc.).

NOTO[®] 40 OD



Giavone (*Echinochloa crus-galli*)



Falso panico (*Setaria viridis*)



Sorghetta (*Sorghum halepense*)



Gowan Italia S.p.A.

Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 629911 • Fax 0546 623943
gowanitalia@gowanitalia.it
www.gowanitalia.it

COMPOSIZIONE

Nicosulfuron (40 g/l) **4,18%**

FORMULAZIONE

Olio Dispersione

INDICAZIONI DI RISCHIO

(N) Pericoloso per l'ambiente

REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE

n. 13812 del 17.05.2007

TEMPO DI CARENZA

Non richiesto

CONFEZIONI

1 - 5 L

Noto[®] 40 OD è un marchio registrato Gowan Italia. Prodotto originale Sapec Agro.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Dosi (L/ha)	Epoche d'impiego
1 - 1,5	Intervenire con la coltura del mais fra le 2 e le 5-6 foglie vere. Sviluppo infestanti: • Graminacee: da 2 foglie a inizio accostamento. • Dicotiledoni: 2-4 foglie.

In caso di infestanti a nascita scalare è possibile frazionare l'intervento:
1 L/ha + 0,5 L/ha dopo 7-10 gg.

NOTO[®]40 OD è perfettamente miscibile con altri erbicidi di post-emergenza

STRATEGIE DI DISERBO MAIS: la soluzione per ogni esigenza

In presenza di infestanti dicotiledoni annuali e perenni

NOTO[®]40 OD + **Cambel[®]_s**
(1-1,2 L/ha) (0,6-0,8 L/ha)

In presenza di Abutilon e Xanthium

NOTO[®]40 OD + **Mitigreen[®]**
(1-1,2 L/ha) (1-1,5 L/ha)

In presenza di elevate e complesse infestazioni, o in assenza di interventi di pre-emergenza

NOTO[®]40 OD + **Mitigreen[®]** + **Cambel[®]_s**
(1-1,2 L/ha) (1 L/ha) (0,6 L/ha)